

藥物成分

劑型

櫃號

Vinblastine

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-878

## ☞ 藥品商品名及含量

敏伯斯登注射液 10 毫克/10 毫升 (Vinblastine)

## ☞ 藥品作用

用於急性白血病、淋巴肉瘤、何杰金氏病。

## ☞ 注意事項

1. 若有下列情形，需要評估是否適用此藥物，請告知您的醫師：曾對本藥過敏、白血球低下、正在細菌感染者，有感染者必須用滅菌劑或抗生素來控制之後，才可用本品治療。
2. 常見的副作用有：白血球減少、貧血、血小板減少、噁心、嘔吐、掉髮、便秘、頭痛等。
3. Vinblastine 只用於靜脈內注射，不可由其他途徑給予。
4. 投與本劑後白血球數未恢復至  $4.0 \times 10^9/L$  ( $4,000/mm^3$ )，即使超過7天也不可再投與本劑。
5. 此藥預期會對胎兒造成傷害，懷孕期間避免使用本藥，具生育能力的女性於治療期間應使用有效的避孕方式。
6. 本藥尚不清楚是否會分泌到乳汁中，因可能對嬰兒引起嚴重不良反應，在治療期間不可哺乳。
7. 重要的藥品交互作用：
  - (1) 活性減毒疫苗：如輪狀病毒疫苗、水痘疫苗、卡介苗疫苗、MMR疫苗、小兒麻痺疫苗、黃熱病疫苗。不可同時使用。
  - (2) 強效CYP3A抑制劑：如ketoconazole、voriconazole、clarithromycin、ritonavir等，同時使用會增加Vinblastine曝藥量。有併用情況需特別注意。
  - (3) 強效CYP3A誘導劑：如rifampin、phenobarbital等，同時使用會減少Vinblastine曝藥量。有併用情況需特別注意。