

藥物成分

劑型

櫃號

Amivantamab

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-812

☞ 藥品商品名及含量

肺倍恩注射劑 50 毫克/毫升 (Rybrevant)

☞ 藥品作用

適用於罹患帶有表皮生長因子受體(EGFR) exon 20插入突變之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)的成人病人，作為含鉑類化學療法治療失敗後之治療。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 目前尚未進行過任何正式的臨床藥物交互作用研究。
3. 可能會引發輸注相關反應，徵兆與症狀包括呼吸困難、潮紅、發燒、發冷、噁心、胸部不適、低血壓以及嘔吐。
4. 光敏感：在治療期間和治療後2個月內應避免陽光曝曬，並注意防曬措施。
5. 常見副作用為指甲改變、甲溝炎、肌肉骨骼疼痛、疲勞、水腫、胃腸道不適，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、皮膚毒性(皮疹、搔癢、乾皮症)、輸注反應、眼毒性(視力模糊、角膜炎、葡萄膜炎、視力障礙)、間質性肺病或肺炎(咳嗽、呼吸困難、發燒)。
7. 根據藥物的作用機轉和動物模型試驗結果，對孕婦投予Rybrevant可能會導致胎兒傷害，治療期間及投予最後一劑後3個月內應採取有效的避孕措施，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，因可能對嬰兒產生嚴重不良反應，服藥期間及投予最後一劑後3個月內不建議哺乳。