

藥物成分

劑型

櫃號

Trabectedin

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-870

## ☞ 藥品商品名及含量

友待凍晶注射劑 1 毫克 (Yondelis)

## ☞ 藥品作用

適用於治療患有無法切除或轉移性脂肪肉瘤(liposarcoma)或平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma)，且曾接受一種含 anthracycline 療程的病人。

## ☞ 注意事項

1. 若有下列情形，需要評估是否適用此藥物，請告知您的醫師：血清膽紅素高於正常值、曾對本藥過敏、嚴重腎功能不良、嚴重肝功能不良者。
2. 有以下情況者：白血球減少、肌肉痠痛、心臟不適、水腫、低血壓，請告知您的醫師。
3. 其他常見的副作用有：噁心、嘔吐、疲倦、便秘、食慾不振、腹瀉、周邊水腫、頭痛、血小板減少、貧血等。
4. 懷孕期間使用本藥會對胎兒造成傷害，具生育能力的女性於治療期間與最後一個劑量後2個月內，應使用有效的避孕方式。
5. 此藥能會損害精子，造成可能的基因與胎兒異常。具生育能力的男性，在治療期間與最後一個劑量的5個月內，應使用有效避孕方式。
6. 可能會造成男性與女性的生育力下降。
7. 哺乳嬰兒可能引起嚴重不良反應，在治療期間不可哺乳。
8. 重要的藥品交互作用：
  - (1) 強效CYP3A抑制劑：如ketoconazole、voriconazole、clarithromycin、ritonavir等，同時使用會增加Trabectedin曝藥量，應避免同時使用。
  - (2) 強效CYP3A誘導劑：如Rifampin、phenobarbital等，同時使用會減少Trabectedin曝藥量，應避免同時使用。