

藥物成分

劑型

櫃號

**Trametinib dimethyl
sulfoxide**

口服藥

版本：TPE202406／檔號：2023-871

☞ 藥品商品名及含量

麥欣霓膜衣錠 2 毫克 (Mekinist)

☞ 藥品作用

治療黑色素瘤、黑色素瘤的輔助治療、非小細胞肺癌。

☞ 服用方式

1. 服用 Trametinib 應搭配一整杯水，整粒吞服。不可咀嚼或咬碎。應於餐前至少 1 小時或餐後至少 2 小時，空腹服用。
2. 不論單一療法或 dabrafenib 併用，建議劑量皆為 2mg 每日一次。當與 trametinib 併用，dabrafenib 的建議劑量為 150mg 每日兩次。
3. 一般建議病人應持續接受 trametinib 的治療，直到無法再獲得效益或出現無法接受的毒性反應為止。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。建議應於每日同一時間服用。若服用後發生嘔吐情形，不應重新服用，應在下一劑排定的時間再服藥。

☞ 注意事項

1. 使用 Trametinib 之前，病人必須先確認帶有 BRAF V600 突變。
2. 治療期間及治療結束後 4 個月內採取高度有效的避孕措施。
3. 儲存於冰箱冷藏(2°C ~ 8°C)。開封後，可在 30°C 以下儲存 30 天。
4. 如果漏服一劑 trametinib，只有在距離下一次預定給藥時間還有超過 12 小時的情況下，方可補服用該劑藥物。當 dabrafenib 與 trametinib 併用時，若漏服一劑 dabrafenib，只有在距離下一次 dabrafenib 服藥時間超過 6 小時的情況下，方可服用該劑 dabrafenib。