

藥物成分

劑型

櫃號

Bendamustine**針劑**

版本：TPE202406 / 檔號：2023-817

☞ 藥品商品名及含量**普癌汰乾粉靜脈注射劑 100 毫克 (Innomustine)****☞ 藥品作用**

藉由類似嘌呤(purine)的結構影響DNA合成，導致現有癌細胞死亡並限制新癌細胞生長，可用於淋巴球白血病、非何杰金氏淋巴瘤的治療。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是巨細胞病毒感染、B型肝炎、帶狀皰疹或結核病。
2. 請勿吸菸，吸菸會減少此類藥物的作用。
3. 常見副作用為噁心、嘔吐、口腔潰瘍、味覺異常、食慾不振、關節疼痛等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮、臉部腫脹、呼吸困難)、異常出血或瘀青、發燒。**
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，接受治療期間應採取有效避孕措施直至療程結束後3個月，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
7. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗生素Ciprofloxacin、情緒改善劑fluvoxamine、氫離子幫浦阻斷劑Omeprazole等。