

藥物成分

劑型

櫃號

Eribulin
mesylate

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-839

☞ 藥品商品名及含量

賀樂維注射劑 1 毫克/2 毫升 (Halaven)

☞ 藥品作用

抑制微管之生長期而不影響其縮短期，且阻擋微管蛋白 (tubulin) 成為非生產性聚集物。

透過tubulin-based antimitotic機制，導致G2/M 細胞週期阻斷並破壞有絲分裂紡錘體(mitotic spindles)，於延長有絲分裂阻斷期後，最終造成凋亡性細胞死亡。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全、腎功能不全、先天性QT波延長。
2. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、黏膜炎、掉髮、白血球減少、血小板減少、輕微貧血、心跳加速等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：持續超過一週的嚴重嗜中性白血球減少症(ANC <500/mm³)、3或4級周邊神經病變、QT波延長。
4. 懷孕等級D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。