

藥物成分

劑型

櫃號

Dacarbazine

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-830

## ☞ 藥品商品名及含量

達卡巴仁注射劑 200 毫克 (Dacarbazine<sup>®</sup>)

## ☞ 藥品作用

藥物結構與DNA組成所需的嘌呤類似，在癌細胞複製合成DNA時干擾嘌呤合成，進而干擾細胞複製、DNA、RNA及蛋白質的合成。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 治療期間，請定期監控肝功能(AST和ALT)。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦、肌肉疼痛、姿態性低血壓等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。服藥期間應注意防曬措施。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹、水泡或脫皮)、發燒、貧血、異常出血或瘀傷。
6. 懷孕等級D，資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
8. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是Barbiturates、Rifampicin、Phenytoin、活性減毒疫苗。