

藥物成分

劑型

櫃號

Cisplatin

針劑

版本：TPE202406 / 檔號：2023-828

☞ 藥品商品名及含量

克莫抗癌注射劑 50 毫克/50 毫升 (Kemoplat)

☞ 藥品作用

藉由藥物本身結構在雙股DNA之間引起明顯的交互連結而抑制DNA合成，進而影響癌細胞生長及蛋白質合成，不限於使用特定細胞週期。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟疾病、聽覺異常、骨髓抑制、懷孕及哺乳等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是aminoglycoside類抗生素、環利尿劑、活性減毒疫苗。
3. 治療期間，請補充足量水分。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、貧血、低血壓、味覺異常等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹、水泡或脫皮)、聽覺或視力異常、肌肉痙攣或僵直、肢端麻木。
6. 懷孕等級D，資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。