

藥物成分

劑型

櫃號

Fluorouracil

針劑

版本：TPE202406 / 檔號：2023-841

☞ 藥品商品名及含量

好復注射液 1000 毫克/20 毫升 (5-FU)

☞ 藥品作用

一種抗腫瘤抗代謝物：干擾DNA的合成、少量地被納入RNA的結構形成非自然的RNA、抑制RNA合成中的尿嘧啶的利用。由於DNA和RNA是細胞分裂和成長所必須，fluorouracil可能引起細胞不平衡的成長和死亡。可與其他化療藥組合對抗多種癌症。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是營養不佳、骨髓功能抑制、潛在的嚴重傳染疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是Leucovorin、骨髓抑制劑。
3. 常見副作用為口腔炎和食道炎(可能引起脫皮和潰瘍)、腹瀉、食慾減退、噁心、嘔吐、腸炎、抽筋、癢斑丘疹皮疹等、手足症候群(末端感覺異常/可能是刺或灼熱感、發紅、腫脹、輕微痛感)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重口腔炎或食道炎、手足脫皮屑/起水泡/傷口潰瘍/嚴重疼痛、嘔吐不止、嚴重腹瀉、胃腸潰瘍、出血、不明原因發燒或有感染跡象。
5. 懷孕等級D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，男性患者使用藥物期間啟避免伴侶懷孕。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。