

藥物成分

劑型

櫃號

Etoposide

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-840

☞ 藥品商品名及含量

癌妥滅靜脈注射液 100 毫克/5 毫升 (Fytosid)

☞ 藥品作用

會造成肌纖維組織母細胞的細胞分裂中期靜止，如哺乳類細胞的細胞週期G2 期。在高濃度下(10 μ g/ml 或更高)，可以觀察到進入有絲分裂的細胞溶解。在低濃度下(0.3 至10 μ g/ml)，則可抑制細胞進入細胞分裂前期。可藉與DNA 異構酶II (topoisomerase II)交互作用或形成自由基，進而誘發DNA股斷裂。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能不良，低白蛋白(albumin)。
2. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、背痛、口中有異常味道、脫髮、食慾不振等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應、皮疹脫皮、血尿血便、視力模糊、心跳不規則、喉嚨疼痛、不明原因出血與疲憊。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
8. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 cyclosporine、抗凝血劑。