

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

**Triptorelin  
Acetate**

**針劑**

版本：TPE202406／檔號：2023-875

## ☞ 藥品商品名及含量

**達菲林長效注射劑 3.75 毫克 (Diphereline P.R.)**

## ☞ 藥品作用

本藥可用於攝護腺癌之輔助療法、子宮內膜異位症、子宮肌瘤切除手術前縮減子宮肌瘤體積之輔助治療、性早熟之治療、女性不孕症在體外受精及胚胎植入之輔助治療、停經前早期乳癌。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他身體狀況，特別是懷孕及哺乳。
2. 常見副作用為性慾降低、熱潮紅、多汗、男性勃起功能障礙、高血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. **如果有下列症狀，請立刻就醫：臉部或眼睛腫脹、癱瘓、頭暈或昏厥、視野模糊、意識改變。**
4. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有死胎的紀錄，接受治療期間應採取有效避孕方式，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是心律不整藥物、抗生素moxifloxacin、抗精神病藥。