

藥物成分

劑型

櫃號

Chlorambucil

口服藥

版本：TPE202406 / 檔號：2023-827

## ☞ 藥品商品名及含量

瘤克寧錠 2 毫克 (Leukeran)

## ☞ 藥品作用

治療慢性淋巴球白血病、霍奇金氏病、某些非霍奇金氏淋巴瘤。

## ☞ 服用方式

1. Leukeran 為口服給藥，易受食物影響，應每日空腹服用(進食 1 小時之前或 3 小時之後)。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請忽略該劑，直接於下一次排定的時間服用下一劑，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請儲存於緊密容器，冷藏 2-8°C 保存，並慎防兒童取用。
2. 若您已知對此類藥物過敏、癲癇或正在服用抗癲癇藥物或有肝功能不良，請先告訴您的醫師。
3. 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑、大蒜、人蔘、銀杏或維他命 E 等，請在服用這些藥物前告知您的醫師。
4. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，治療期間請作好避孕措施，以避免受孕。
5. 未告知醫師前，建議勿施打疫苗，以免影響疫苗效果。
6. 常見副作用為 1. 口腔炎、噁心、嘔吐、腹瀉，食慾不振
7. 發燒、疲倦 3. 皮膚疹 4. 手腳麻木、刺痛、感覺異常
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：1. 嚴重過敏反應 2. 異常的瘀傷或出血 3. 視力受損 4. 顫抖、癲癇、意識不清
9. Leukeran 錠不可被分割。