

Cephalosporin 系抗生素

“信東” 賜福得修 膠囊 500 公絲
(西華卓西)

Cefadroxil CAPSULE 500mg “S.T.”

Cefadroxil monohydrate 是頭孢子菌素 (Cephalosprin) 衍生而來之半合成新型口服抗生素，為白色—微黃色結晶性粉末，易溶於水，於酸中穩定。其結構如下：



化學名：7-〔〔 D-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl 〕 amino }-3-methyl-8-oxo-5, -thia-1-azabicyclo [4,2,0] oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate.

[成 分]

每一膠囊含：

Cefadroxil monohydrate..... 500mg (potency)
(equi to Cefadroxil anhydrous base)

[特 點]

- (1)本劑係廣效性抗生素，其作用機序係抑制細菌細胞壁之合成。
- (2)本劑口服不受食物干擾，口服吸收快，且持續時間久，短時間內即可達血中有效濃度，且可持續 12 小時之久，口服後約 24 小時內有 90% 以上以原有形態從尿中排出體外。
- (3)服用簡便，甚至每天用藥一次，即可達最佳之臨床效果。

[作 用]

本劑對葡萄球菌，β 型溶血性鏈球菌、肺炎雙球菌、變形桿菌、大腸桿菌、克雷白氏桿菌及其它具有感受性細菌引起之感染症有效，一般用於治療下列之感染症：

- (1)尿道系統感染症：由於大腸桿菌、變形桿菌、克雷白氏桿菌引起的各種感染症。
- (2)皮膚、皮膚組織感染症：由於葡萄球菌、鏈球菌引起的各種感染症。
- (3)呼吸器感染症：如 β- 溶血性鏈球菌引起的咽喉炎。

[適 應 症]

革蘭氏陽性及陰性菌所引起之感染症。

[用法・用量]

☉ 對成人而言：

- (1)尿道系統感染症：①沒有併發症之下部尿道系統感染，通常劑量一天為 1Gm 或 2Gm，分一次或二次服用之。
②其他各種尿道感染症，通常劑量 1 天為 2Gm 分二次服用之。
- (2)皮膚或皮膚組織感染症：
通常劑量一天為 1Gm，分一次或二次服用之。
- (3)呼吸器感染症：由於 β 型溶血性鏈球菌引起之咽喉炎，通常劑量一天為 1Gm，分二次服用 10 天。

♣ 兒童：通常 30mg / kg 每天，分兩次服用，依年齡、體重及症狀增減。

本藥須由醫師處方使用。

☉ 對腎臟功能不全之患者，必須依其 Creatinine 之廓清率（ Clearance ）來調整劑量及投與間隔時間，以防止其藥物積蓄，通常劑量最初為 1Gm，而持續劑量為 500 mg 其間隔時間如下：

Creatinine Clearances	間 隔 時 間
0-10ml / min	36 小時
10-25ml / min	24 小時
25-50ml / min	12 小時
750ml / min	按正常規定

[注意事項]

- (1)曾對 Cephalosporin 系製劑有過敏反應之患者，不可使用本劑。
- (2)有下列情況之患者，宜慎重投與：
- 對 Penicillin 製劑有過敏反應之患者，因臨床及實驗室均有 Penicillin 與 Cephalosporin 部分交互過敏之報告。
 - 曾有某些型式之過敏反應者，尤其是對藥物有過敏現象者，應小心使用。
 - 高度腎臟機能不全之患者。
- (3)長期使用本劑，可能引起非感受性微生物過度繁殖，造成重複感染，須注意之。
- (4)服用本劑，可能有假性 Coomb's test 反應發生。
- (5)對老鼠試驗，並沒有造成畸型或抗受孕之報告，但對懷孕婦女之安全性，臨床上尙未有明確報告。

[副作用]

- (1)服用本劑，臨床上有噁心、下痢、排尿困難等胃腸症狀出現，可與食物同時服用，減低噁心之副作用。
- (2)服用本劑，倘有發疹、蕁麻疹、淋巴腺腫脹、性器搔癢症、腫炎等過敏症狀出現時，應立即中止使用，並以一般之治劑治療之（如 Pressor amine Corticosteroid, or Antihistamine）。

[包 裝]

4 ~ 1000 粒塑膠瓶裝，鋁箔盒裝

衛署藥製字第 025659 號



信東生技股份有限公司 觀音廠
桃園縣觀音鄉國建一路 1 號