

"信東" 暢寧 錠 10 公絲

Cetia Tablets 10mg "S.T."

Cetirizine 為 Anti-H₁ 之抗過敏治療劑，且無明顯的 Anti-Cholinergic 及 Anti-Serotonin 作用，在有效劑量內 Cetirizine 不會通過血管障壁，對中樞神經沒有作用，不會產生安眠及行為異常等現象。

【成分】

每錠中含有：

Cetirizine dihydrochloride 10mg

【適應症】

季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

【用法·用量】

成人及 6 歲以上孩童適用。晚餐時，口服 10mg Cetirizine(即一錠) 與液體伴服。

對副作用敏感之患者，改為早晚各服 5mg Cetirizine (即半錠)。

本藥須由醫師處方使用。

【特性】

1. 迅速抑制外生性組織胺。
2. 對內生性組織胺的釋出有抑制作用(如 48/80 之組織胺)
3. 抑制由 VIP(Vasoactive Intestinal Polypeptide) 和 Substance P 所引起之過敏反應。
4. 抑制初期皮膚過敏反應時，組織胺介質的作用。
5. 明顯抑制發炎性細胞(例如: eosinophils) 的移動，而降低遲發性皮膚過敏反應的介質釋放。
6. 顯著的降低氣喘患者的支氣管對組織胺的過度反應。
7. 降低由特殊過敏原引起的過敏反應。

這些作用，心智測驗及 Quantified EEG 得知，對中樞神經不會產生任何作用。

【注意事項】

- 在治療劑量下，Cetirizine 不會加重酒精 (血中酒精濃度為 0.8g/L 時) 的作用，但應避免。
- 孕婦及授乳婦
動物實驗上，尚無引起畸型胎之報告，但懷孕 (尤其是前 3 個月) 及哺乳的婦女請勿投與。
- 藥物交互作用

至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用鎮靜劑者，請謹慎使用。

• **開車或操作機械**

實驗證明，對正常人投予 20-25mg/天的劑量，不會影響警覺及反應時間，但從事駕駛及操作機械者，請小心使用，儘量不要過量服用。

• **過量**

超過 50mg/次使用，會有安眠之症狀發生，無特殊之解毒劑，因此，如有此現象發生，請儘快以灌腸法及一般急救法處理。

【禁忌症】

對本藥中任何成分有過敏者。

【副作用】

曾有報導顯示會發生輕微、短暫的主觀性副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、精神激昂、口乾、胃腸道不適。

但由精神運動性 (psychomotor) 的客觀性功能試驗結果來看，Cetirizine 的鎮靜作用發生率與安慰劑的效果相似。Cetirizine 的過敏性徵狀極少被報導。

【藥物動力學】

口服 Cetirizine 1 小時內，會達血中最高濃度。血漿半衰期成人約為 10 小時，6~12 歲的孩童約為 6 小時。成人及孩童的蓄積腎排泄量(cumulative urinary excretion) 約為投藥量的三分之二。通常孩童的血漿清除率要比成人為高。Cetirizine 的吸收並無個體差異。體內血漿濃度與投藥量成線性關係。Cetirizine 與血漿蛋白具有很強的結合能力。

【貯存】

將本品於 30 °C 以下，密封、避光貯存。

【包裝】

2~1,000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 043306 號 G -6861



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路 22 號

TC 037②