

“柏理” 康速龍錠 5 毫克（培尼皮質醇）  
Compesolon Tablets 5mg “Pine Lawer” (Prednisolone)

## 【主成分】每錠含

Prednisolone.....5mg

## 【適應症】

風濕性關節炎、風濕熱、骨關節炎、風濕性脊髓炎、氣喘、過敏性疾病。

## 【用法 / 用量】

1. 用於氣喘時，每一週內每天 30-60mg，以後遞減，每天維持量 10-30mg。

2. 嚴重之關節炎（風濕性）每天 30mg，輕症每天 20mg。

本藥須由醫師處方使用。

## 【注意事項】

1. 急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
2. 對消化管障礙如胃腸潰瘍患者務請特別注意。
3. 因主要副作用為引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟病患及高血壓患者應注意。
4. 糖尿病患者使用時，請注意增加 Insulin 之用量。
5. 對於有精神病因素者多加注意。
6. 服用本劑期間請充分補充蛋白質。
7. 長期服用應定期做血液、X 光、眼睛、血壓、身高、體重等檢查。

## 【警語】

1. 長期服用此藥的兒童，應小心觀察其生長及發育情形。
2. 高劑量或長期治療者，不宜驟然停藥。應緩慢減低劑量並觀察病人反應。
3. 皮質類固醇會降低人體的免疫力而使感染容易擴散，如發覺徵狀有異或惡化，應立即告知醫生。
4. 治療期間，尤其是高劑量使用者，不宜接種疫苗。

## 【副作用】

可能引起肌肉無力、骨質疏鬆症、腹脹、噁心、嘔吐、食慾及體重增加、胃潰瘍，可能伴隨有穿孔或出血、傷口癒合能力不佳、皮膚變薄而脆弱、多毛症、頭痛、失眠、月經不規則、排汗增加、高血糖、眼內壓升高、產生類庫興氏（Cushingoid）症狀等。

## 【包裝】

4-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

## 【貯藏】

請儲存於 25°C 以下。



委託者：柏理貿易股份有限公司  
地址：台北市 104 松江路 65 號 4 樓  
訂貨專線：02-2500-6378 / 傳真：02-2503-7755  
製造廠：應元化學製藥股份有限公司  
台灣台南市安平工業區蒲苙路26號 TEL:(06)2654883(代表號)