



"瑞士"

佐胃健 注射液

Chiaowelgen Injection "Swiss"


使用含 metoclopramide 成分藥品可能造成遲發性運動障礙 (tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量 (total cumulative dose) 有正相關性，且分析本品之使用狀態，約 20% 病人使用超過 12 週，故不建議長期 (超過 12 週) 使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生 tardive dyskinesia 之風險者。

Metoclopramide 注射液係一種消化機能異常治療劑，對於腦幹之消化機能調整部位具有選擇性作用，故能在不影響胃液分泌及胃液酸度之情況下調整胃腸運動機能，使患有胃部停滯症之胃官能性運動失常患者增加胃蠕動力，並使幽門、十二指腸暢通，以恢復其正常胃排空功能。此外，佐胃健亦具有中樞性及末梢性嘔吐抑制作用，對各種起因之嘔吐及手術後嘔吐預防均有作用，是一多目標性之胃腸官能異常改善治療劑。

【成分】

Each Ampoule (2ml) contains :

Metoclopramide Hydrochloride..... 10 mg



$$\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{ClN}_3\text{O}_2 \cdot \text{HCl} \cdot \text{H}_2\text{O}$$

Mol wt=299.81

2 • methoxy-4-Amino-5-chloro-N-diethyl-aminoethyl-Benzamide

白色或淡黃色結晶或結晶粉末，殆無臭，具苦味，易溶于水、酒精，對空氣、光、熱不安定，其水溶性在酸性下安定，在鹼性中不安定。

【賦形劑】

Sodium Chloride、Benzyl Alcohol、Water For Injection

【藥理特長】

1. 調整消化管蠕動異常-本劑可調整胃的蠕動，促進幽門前庭部幽門、十二指腸之暢通。解除胃部停滯，對於食慾不振、噁心、腹部膨脹感等症狀有顯著效果。

2. 抑制中樞性嘔吐及末梢性嘔吐-本劑對於 Apomorphin 及硫酸銅之催吐作用具有拮抗作用，作用強，口服時為 Chlorpromazine 之 35 倍強，皮下注射 19 倍強。對於各種噁心、嘔吐均能奏能。亦可用為手術後嘔吐之預防。
3. 作用具有選擇性-本劑作用於腦幹消化機能調整部位，有特異之選擇性，不影響胃液之分泌及其酸度，因而對於過酸性或低酸性之胃腸機能障礙均可使用。而且本劑不致影響胃腸之正常機能。
4. 可用為胃腸 X-ray 檢查之輔助劑。加速 Barium meal 之通過速度，以提早完成 X-ray 檢查。

【適應症】

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

成人通常一天 1~2 次，每次 10mg，肌肉注射或靜脈注射。依年齡、症狀。輕重適宜增減。

【注意事項】

注射液在使用後，極少數兒童發生嗜睡或輕微肌肉緊張，此種現象為暫時性，停止用藥，保持安靜，症狀即會消失。懷孕用藥分級 B：動物實驗證實對胎兒無害但缺乏足夠的孕婦實驗；或動物實驗有副作用報告，但孕婦實驗無法證明對懷孕初期及後期之胎兒有害。

【警語】

投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用 metoclopramide 藥品相關的不良反應如肌張力失調（dystonias）及錐體外路徑反應（extrapyramidal reactions），於小兒族群比起成人更容易發生。

【儲存條件】

請儲存於 25°C 以下。

【包裝】

2 毫升 10、100 安瓿裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路 182 號