



蠕蟲驅蟲劑

CQT-004
衛署藥製字第11644號
Code No.:38043

“永信”

痞克 Conquer

錠

Tablets "Yung Shin"

3.98cm

蠕蟲(helminths)即包括蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲、鞭蟲等腸寄生蟲所引起的人類疾病分佈於世界各地，一般看來，對寒帶地區此種寄生蟲固然能帶來人們的騷擾與不適，但尚未對健康造成重大的危害。然而在我們居處的亞熱帶情形就不同了，由於氣候、社會經濟、人種以及環境之因素，嚴重的腸寄生蟲病真是十分猖獗，由蛔蟲病，鈎蟲病，蟯蟲病，鞭蟲病甚至血吸蟲病等種種寄生蟲病所造成的健康損害、經濟損失，以及人們精神的損耗，真是無以言記。尤其此等腸寄生蟲病常以無聲無息之姿態安閒寄生於大群的成人與小孩體內，經以時日俟大量成蟲（概由蟲卵形成）寄生才顯出病狀，遇高度感染始有食慾不振、腹痛、腹瀉、遺尿症、下痢、並伴隨有不安、失眠、肛門搔癢症、營養不良等症狀，而使患者不勝其煩，因此腸寄生蟲之即時驅除實具重大意義。

現市場上對蛔、鈎、蟯蟲之驅除藥已有很多種藥品，但單獨對鞭蟲感染症或混合感染症有直接作用之治療藥劑仍是闕如，本藥乃應運推出，係針對鞭蟲、蛔蟲、鈎蟲之成蟲及蟲卵有特效之驅蟲劑。本藥主成分Mebendazole是最近在歐洲最廣用之廣範圍驅蟲劑，除對鞭蟲有卓越之驅除效果外，對蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲亦能發揮其顯著之驅除能力，同時對此等寄生蟲之蟲卵亦具排除之效果，此乃與其他驅蟲劑相異之處，亦為本藥之優點，實為近年腸寄生蟲驅除劑之第一選擇藥物。

【成 分】每錠中含：

Mebendazole.....100mg

【作 用】

Mebendazole之驅蟲作用機序係直接阻斷感染寄生蟲之葡萄糖吸收而即刻耗盡其生活能力，進而不能生存死亡。Mebendazole在體內僅微少部份由胃腸道吸收，三天內由尿中以代謝物或原型物排出體外。

【特 徵】

1. 本藥對腸寄生蟲之單獨感染或混合感染及其蟲卵均有優越之驅除效果，其成效有如下表：

	鞭 蟲	蛔 蟲	鈎 蟲	蟯 蟲
驅蟲效果 平 均 (有效範圍)	68% (61-75%)	98% (91-100%)	96% (-)	95% (90-100%)
蟲卵排除率 平 均 (有效範圍)	93% (75-99%)	99.7% (99.5-100%)	99.9% (99.6-100%)	- -

2. 本藥對鞭蟲、蛔蟲及鈎蟲蟲卵之排除有獨到之效果，而防止驅蟲後蟲卵在體內再生長成蟲之再感染症狀。
3. 本藥服用不受飲食時間限制，只要早、晚各服1粒，連服三天，即能對腸寄生蟲成蟲及蟲卵一網打盡，一次清除清淨。
4. 本藥服用時不需禁食，亦勿需使用瀉劑清腸或通便。

【適 應 症】

驅除鞭蟲、蛔蟲、蟯蟲及鈎蟲。

【用法·用量】

成人與小孩之用量相同。欲同時驅除鞭蟲、蛔蟲及鈎蟲之成蟲及蟲卵時，每次1錠，每日早晚各一次，連續服用三天即有效果。驅除蟯蟲只要服用一次（1錠）就有效。如果服用一治療程後三星期過後仍未驅除殆盡時宜再服用一治療程，以確定寄生蟲及蟲卵的驅除完全。服藥時不需禁食或清腸通便。本藥須由醫師處方使用。

【注 意 事 項】

1. 對本藥過敏者禁服本藥。
2. 即使在高劑量下，沒有任何證據顯示本藥對胞蟲病有效。
3. 無致畸胎性、突變性。
4. 孕婦使用：大老鼠動物實驗有胚胎毒和致畸形活性。在懷孕期間，特別是懷孕前三個月使用本藥，必須在其潛在的利益大於潛在的危險性時，方可使用之。
5. 哺乳期使用：本藥是否由母乳中排出未知；但哺乳的母親服用仍須小心。
6. 兒科使用：對2歲以下之小孩使用，安全性未確立，使用前宜衡量利弊。
7. 副作用：假如有大量感染和驅蟲時，會有短暫的腹痛和下痢等症狀發生。
8. 過量：若過量發生時，必須誘導嘔吐和瀉下。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 室溫（15~30°C）、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

4~1000錠塑膠瓶裝，鐵罐裝、AL-FOIL鋁箔盒裝、PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140578