

12x17cm

“景德” 秋水仙鹼片 0.5 毫克

COLCHICINE Tablets 0.5 mg

" Kingdom "

【主成分名】 Colchicine

【劑型、含量】 錠劑：每錠含 Colchicine (0.5mg)

【適應症】 痛風。

【用法用量】 通常成人一日 Colchicine 3~4mg 分 6~8 次口服，但依年齡、症狀得適量增減之。

預防發病時，通常成人一日 Colchicine 0.5~1mg，有發作之預感時，一次 0.5mg 口服。

註一：發現痛風發作時，應及早開始服用，效果較佳。

註二：作預防之長期投與，可能會有血液障害、生殖器障害、肝、腎障害、脫毛等嚴重副作用發生，如非必要之長期投與，不宜推薦使用。

本藥須由醫師處方使用。

【動物試驗】 毒性：

1. 急性毒性(LD₅₀ mg/kg)

動物 \ 投與路徑	靜脈注射	皮下注射
Mouse	—	1.2~2.0
Rat	1.7	—

2. 催畸形性：

對 Mouse 實驗中，被認為有催畸形性作用。

3. 其他：

抑制痛風發作之劑量的 100 倍量，具有抑制細胞核有絲分裂的作用。

【注意事項】 1. 一般注意事項：

(1) 大量使用或誤用時，在服用後數小時內就會引起下列急性中毒症狀，故應嚴守用法、用量規定，並注意(A)、(B)兩項：噁心、嘔吐、腹痛、激烈下痢、咽頭、胃、皮膚之灼熱感、血管障害、休克、血尿、少尿、明顯的肌肉脫力感，中樞神經系之上行性麻痺、譫妄、痙攣、呼吸抑制而導致死亡。

(A) 治療痛風的發作，一次投與 0.5mg 就會緩解疼痛之發作，一直到下痢、嘔吐等胃腸障礙發生為止，每 3~4 小時投與一次，一日量以 3~4mg 為限。

(B) 為避免副作用之發生，要以比產生胃腸障礙的劑量再減少 0.5~1.0mg 投與。

(2) 由於長期投與，有時會引起血液障害、肝、腎障害等，故用於預防疼痛發作時，請注意作檢尿，末梢血檢查(特別是白血球)以及肝功能的定期檢查。

2. 下列患者請慎重投與：

老年人，身體非常衰弱的患者(特別是有腎疾病、胃腸疾病和心臟疾病的患者)。

【副作用】

(1) 長期投與：有時會有再生不良性貧血、顆粒球減少、白血球減少、血小板減少、脫毛、皮疹、肌肉病變、末梢神經炎、血尿、少尿等症狀發生，應仔細觀察。如有這些症狀發生，應即停止投與。

(2) 過敏症：有時會有全身搔癢、發疹、發熱等症狀，應仔細觀察，如有這些症狀發生，應即停止投與。

(3) 胃腸：有時會有下痢、噁心、嘔吐、腹痛、腹部痙攣等較嚴重的胃腸障害發生，應仔細觀察，如有這些症狀發生，應做減量投與或暫時停藥等的處理。

(4) 其它：有時會有脫力感現象發生。

孕婦的投與：

動物實驗中有催畸形作用之報告，孕婦或可能懷孕之婦女，以不投與為原則。

其他：

男生服用本劑時，其配偶有可能出生 Down's Disease 及其他先天性異常兒之報告。

【賦形劑】 Lactose、Corn Starch、Sodium Starch Glycolate、PVP K-30、Magnesium Stearate、New Coccine Red No.6。

【貯存】 本品應於避光容器中 15~30°C(59~86°F)下儲存。

【包裝】 4~1000 粒鋁箔盒裝、瓶裝。

內衛藥製字第 006271 號

委託者：景德製藥股份有限公司

地址：台北市中山區中山北路二段113號8樓

製造者：寶齡富錦生技股份有限公司平鎮廠

地址：桃園市平鎮區興隆路 266號

DP206SA01IN01