

衛署藥製字第 045919 號
GMP-G-8136

“黃氏”抗膚敏乳膏
Confumin Cream “H.S.”

抗膚敏乳膏係採用合成的含氯分子局部類固醇成份 Halcinonide，加上親水性基劑調製而成，其結構及性質與 Betamethasone、Triamcinolone 很類似。Halcinonide 具有明顯的抗發炎、止癢及血管收縮作用。

成份：Each Gm Contains:

Halcinonide Micro.....1.0mg

適應症：

敏感性皮膚炎、接觸性皮膚炎、神經性皮膚炎、濕疹性皮膚炎、幼兒濕疹及牛皮癬。

用法用量：

每日 2~3 次適量塗抹於患處。本藥須由醫師處方使用

禁忌症：

本產品與其它局部使用之類固醇相同，應禁止使用於皮膚結節，黴菌及病毒引起的皮膚損害（包括天花和水痘）及對本成份會產生過敏者。本產品不適合用於眼部及耳鼓穿孔病人的外耳道。

注意事項：

- 1.用藥期間若發生感染情況，則需立即配合殺菌或抗黴菌藥物治療；若治療沒有很好的成效，則需暫停使用本藥，直到感染已得到良好的控制。
- 2.局部使用很少會發生全身性副作用，但有時會因抑制腦丘下體~腦下垂體~腎上腺軸（Hypothalamopituitary-Adrenal Axis）而引起一些全身性副作用，尤其是大量、長時間或包覆式用藥。
- 3.本產品不適合用於眼部。

- 4.長期間使用易造成皮膚萎縮，此時需暫停用藥。
- 5.本產品用於嬰兒時需特別留意副作用。
- 6.本產品用於孕婦及授乳婦時，因藥品安全資料尚未完全建立，需評估其用藥效益後，才可使用。
- 7.須置於小孩接觸不到之處。
- 8.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 9.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 10.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 11.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
- 12.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 13.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥就醫。
- 14.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 15.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再帶隱形眼鏡。
- 16.深部皮膚組織感染請就醫治療。
- 17.黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。
- 18.一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。
- 19.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇或非類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。

副作用：

本產品之藥效極佳，局部刺激發生率不高，但對某些患者會產生短暫性的燒灼感；用於包覆式療法較易引起粟粒疹，毛囊炎、膿皮病及局部表皮萎縮；用於傷口或包覆式使用易造成萎縮紋；其它曾發生的副作用包括皮

膚發紅，乾燥、搔癢、多毛症及皮膚色素沈積；亦有報告指出偶會抑制腎上腺之功能。

【局部性】：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。

【全身性】：庫欣氏症候群（Cushing's syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等）、繼發性腎上腺功能不足（secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔心、食慾不振、體重減輕，低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等）。

警語：

1. 對藥物各成份過敏者不得使用。
2. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
3. 癬類或其它皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
4. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
5. 皮膚的黴菌感染有時不易與其它皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

包裝：1000 公克以下鋁軟管裝

儲存 25°C 以下

黃氏製藥股份有限公司 G.M.P.藥廠
雲林縣斗南鎮大同路 444 巷 11 號

E-39