

達爾諾 膠囊200 毫克

Danazol Capsules 200 mg

【成分】：每膠囊含有：

Danazol.....200mg

【臨床藥理】：

1. Danazol 乃是藉著抑制腦下垂體釋放性腺激素（gonadotropins）而抑制腦下垂體－卵巢神經軸（pituitary ovarian axis）的功能，研究確認此藥既不具動情激素（estrogenic）也不具有助孕素（progestational）作用，Danazol可抑制濾泡激素（F.S.H.）及黃體化激素（L.H.）的釋放。具有輕微男性激素（Gandro-genic）作用則與給予的劑量有關。
2. 最近有證明指出Danazol可直接抑制性腺（gonadal）部位，且可和作用器官（target organs）的性腺類固醇（gonadal steroids）的受體結合，而產生抑制。
3. 在治療子宮內膜異位方面：Danazol會改變正常及異位的子宮內膜組織使其失去活性而萎縮。Danazol可使大部分發生子宮內膜損傷的病例完全消除，由於Danazol對腦下垂體－卵巢神經軸的抑制可改變陰道細胞及子宮頸黏膜。
4. 在治療纖維性囊腫性乳房疾病時：Danazol通常可使結節部分或完全消除，且可使疼痛和觸痛完全消除，但可能會改變月經週期。一般而言，Danazol對腦下垂體的抑制是可逆性的，當停止治療，排卵和月經會於60至90天內恢復正常。

【適應症】：

子宮內膜異位症、早發春機發動、囊狀慢性乳腺炎、乳腺肥大、乳痛、月經過多、纖維性囊腫乳房疾病。

【用法用量】：

1. 子宮內膜異位：

中度到重度子宮內膜異位或是因而不能孕育者一開始劑量是800 mg，分兩次給藥。停經或急速疼痛之症狀亦可用此劑量給藥。輕度-200 mg至400 mg一天，分2次給藥。

以上應從月經期間開始治療3-6個月不可中斷。視病況需要可再延長至9個月，結束治療後，若再發病可再重覆同樣方法。

2. 纖維性囊腫性乳房疾病：

100 mg至400 mg一天，分2次給藥，亦應從月經期開始給藥。

大部份病例第一個月乳痛、觸痛可明顯減輕，2-3個月內即可消除，若從不間斷治療可在4-6個月內消除結節。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】：

Danazol不應給具有下列情況之患者：

1. 未經診斷之生殖器不正常出血者。
2. 肝、腎、心臟功能明顯受損者。
3. 孕婦。
4. 哺乳者。

【警告】：

1. 懷孕期間使用此藥的安全理論尚未建立，因此治療期間懷孕了，則須停藥，若繼續投與胎兒會有男性化現象，尤其女胎兒會明顯導致外生殖器陰蒂肥大和陰唇融合。
2. 治療纖維性囊腫性乳房疾病之前應先排除乳癌因素，所以治療期間若有結節存在，甚或變大就必須考慮是否為乳癌並詳細檢查。
3. 長期治療在C17位置上有烴基化（alkylation）的類固醇，已被證明有膽汁鬱滯黃疸、肝紫斑等毒性產生，醫師應機警地用Danazol於長期治療。
4. 病人應謹慎注意男性化的現象。

【副作用】：

1. 男性化影響：痤瘡、水腫、輕微多毛症、乳房縮小、聲音低沉、皮膚頭髮油膩、體重增加、少數有陰蒂肥大或睪丸萎縮。
2. 低動情激素症：表現在臉部潮紅、流汗、陰道炎（包括癢、乾燥、灼熱及陰道出血）、神經緊張和情緒變化等。
3. 每日劑量超過400 mg會有血清酶升高或黃疸等肝功能損害報告。

【注意事項】：

1. 投與本品前均須檢查有無懷孕。
2. 本品可能引起某種程度之體液滯留、癲癇、偏頭痛、心臟或腎功能不良，須特別注意。
3. 治療期間須定期肝功能測試。
4. 青春期的患者每隔3-4個月須檢查精液體積、黏度、精蟲數及運動性能。

【賦形劑】：

Potato Starch, Sodium starch glycolate, Hydroxypropyl cellulose L, Lactose

**Monohydrate, Aerosil 200, Magnesium stearate, No.2 Hard shell capsule 衛署
藥製字第033671號 (Gelatin, Sodium lauryl sulfate, Glycerol, New coccine,
Sunset yellow FCF, Titanium dioxide)**

【儲藏】：

貯存於25°C以下避光、緊密之容器內。

【包裝】：

2-1000 粒瓶、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-1217 031280 號

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠

製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號