

"南光" 得安寧 注射液·錠

Dianlin Injection · Tablets "N.K."

- 成份：  
每1ml含:Diazepam.....5 mg  
每一錠含:Diazepam.....5 mg

□特點：  
本劑之主要成分Diazepam為Benzodiazepine類中作用廣泛之製品，對於自律神經之安定、鬆弛、鎮靜安眠及肌肉緊張之緩解，均具卓效。而其耐受性亦極良好。

□適應症：  
焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣、癲癇重積狀態。

□用法用量：  
(1)注射：一般成人初回10 mg肌肉或緩慢靜脈注射，以後必要時每3~4時注射一次，視疾患的種類，症狀的程度、年齡或體重酌量使用之。但8小時內不得超過30 mg。限由醫師使用。  
(2)口服：成人一日量5~30 mg，分次口服使用。須由醫師處方使用。

□注意事項：  
(1)服用本劑時請勿飲酒。  
(2)老年人患有嚴重之心臟病者，如需服用本劑時，應請醫師特別指示。  
(3)孕婦應避免使用。

□禁忌：  
重症肌無力症、綠內障或已往有此病歷之患者。

□包裝：  
1, 2 ml安瓿，100 支以下盒裝。  
2~1000粒塑膠瓶或鋁箔盒裝。

注射液:衛署藥製字第 003355 號  
錠劑:衛署藥製字第 017994 號

台灣·台南縣新化鎮中山路 1001 號  
TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5972033

"南光" 得安寧 注射液·錠

Dianlin Injection · Tablets "N.K."

- 成份：  
每1ml含:Diazepam.....5 mg  
每一錠含:Diazepam.....5 mg

□特點：  
本劑之主要成分Diazepam為Benzodiazepine類中作用廣泛之製品，對於自律神經之安定、鬆弛、鎮靜安眠及肌肉緊張之緩解，均具卓效。而其耐受性亦極良好。

□適應症：  
焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣、癲癇重積狀態。

□用法用量：  
(1)注射：一般成人初回10 mg肌肉或緩慢靜脈注射，以後必要時每3~4時注射一次，視疾患的種類，症狀的程度、年齡或體重酌量使用之。但8小時內不得超過30 mg。限由醫師使用。  
(2)口服：成人一日量5~30 mg，分次口服使用。須由醫師處方使用。

□注意事項：  
(1)服用本劑時請勿飲酒。  
(2)老年人患有嚴重之心臟病者，如需服用本劑時，應請醫師特別指示。  
(3)孕婦應避免使用。

□禁忌：  
重症肌無力症、綠內障或已往有此病歷之患者。

□包裝：  
1, 2 ml安瓿，100 支以下盒裝。  
2~1000粒塑膠瓶或鋁箔盒裝。

注射液:衛署藥製字第 003355 號  
錠劑:衛署藥製字第 017994 號

台灣·台南縣新化鎮中山路 1001 號  
TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5972033

