

拭皮爽[®] 軟膏

Esperson[®] Ointment

0.25%

0.25%

Desoximetasone



衛署藥輪字第022600號

成分：

拭皮爽軟膏0.25%每公克含有Desoximetasone 0.25公絲(0.25%)於水/油乳劑中。

特性：

拭皮爽軟膏所含主成分desoximetasone係專供局部使用之強效腎上腺皮質素，具有消炎、抗過敏、抗滲出、抗增生、及抗搔癢作用。

適應症：

溼疹、牛皮癬、燒傷、晒斑、昆蟲咬傷等皮膚感染症。

禁忌症：

1. "拭皮爽"軟膏不可使用於眼部。
2. 對desoximetasone，其它betamethasone類的腎上腺皮質素，或本品之賦形劑過敏者不可使用本品。
3. 本品含有石蠟，可能會導致橡膠保險套滲漏或破裂，因此，應避免本品與橡膠保險套碰觸，因為保險套的保護作用可能會因而喪失。
4. 因接種疫苗導致皮膚反應的患者，或有結核病、梅毒、病毒感染(如水痘)、酒渣鼻、皮膚炎等的皮膚症狀者不可使用包括本品在內的局部用腎上腺皮質素，因可能會使病情惡化。
5. 懷孕及授乳期：為避免desoximetasone被吸收的危險，於懷孕及授乳期不可廣範圍地使用本品。但如果必須使用本品時，可使用於小範圍之皮膚患部。

警告及注意事項：

1. 嬰兒及 6 歲以下兒童於絕對必要情況下才可使用本品，因為於此種年齡層之幼童因腎上腺皮質素吸收而導致全身性作用(如成長遲緩)的危險性增加。若無法避免必須使用本品，則應使用最小之有效治療劑量。
2. 於成人某些特例中可能須使用本品於大範圍的皮膚患部，此種情況下，尤其是長期使用時，應考慮腎上腺抑制的可能性。如果發生此種現象，可能需要逐漸停用本品。
3. 於治療期間，如果小劑量的局部用腎上腺皮質素(包括"拭皮爽"軟膏)重覆接觸結合膜囊可能會導致眼內壓增加。因此，若須長期使用本品於眼睛周圍應先仔細評估其利弊，並應於醫療人員監測下使用本品。
4. 局部腎上腺皮質素如"拭皮爽"軟膏於細菌和/或黴菌皮膚感染時，只可作為症狀治療，應併用抗菌或抗黴菌治療。

副作用：

1. 於使用本品治療的皮膚部位可能有毛囊炎、多毛、痤瘡、色素過多或過少、毛細管擴張、皮脹紋、皮膚萎縮、皮膚浸軟等症狀。尤其於長期用藥及使用密閉式敷料情況下較可能發生。
2. 只有少數個例使用本品會導致皮膚局部過敏反應。
3. 若使用本品於廣大範圍，長期使用，或使用密閉式敷料可能會產生全身性腎上腺皮質素作用。
4. 如果發生任何上述副作用，或其它非預期作用或變化(如皮膚變化)請向醫師諮詢。

用法用量：

1. 本藥須由醫師處方使用。
2. 劑量一般依下列原則由醫師依個別需要決定：
每天於皮膚患者塗敷少量的"拭皮爽"軟膏一次或二次，如果必要時可使用三次。如果可能，應輕柔按摩。皮膚傷口漸癒後可減少用藥次數，例如由每天二次減少為每天一次。
3. 應避免使用於廣大範圍(超過體表約10%)及長期治療(超過約4週)，因可能會導致全身性腎上腺皮質素作用。並且，長期治療可能會導致更多明顯的局部作用。
4. 劑量錯誤：短時間的劑量誤差(使用於過大範圍或使用過量，用藥次數過多，或少一次用藥)不會有不良影響。若有此情形，請洽醫師。
5. 用藥過量：由於吸收大量desoximetasone，可能會發生全身性腎上腺皮質素作用，特別是使用本品於大範圍皮膚部位或長期使用情況下。於此情形下，應減少用量或完全停止治療。若可能產生腎上腺抑制，應考慮逐漸停止治療。

貯存：

請置於+25°C 以下貯存。

請置於孩童無法觸及處。

包裝：

2.5 毫克(0.25%)：1000 公克以下鋁管裝。

藥商：賽諾菲股份有限公司

地址：台北市復興北路337號12,13,14樓

製造廠：Handok Inc.

78, Daepungсандan-Ro, Daeso-Myeon, Eumseong-Gun, Chungcheongbuk-do, Korea