

雌激素缺乏治療劑

**益斯得錠** 2 毫克

**Estrade** Tablets 2MG

**【成分】**每錠中含有

Estradiol Valerate ..... 2mg.

**【適應症】**

更年期症狀及停經後引起的各種病症、卵巢切除之患者(因疾病或腫瘤而將卵巢切除)。

**【用法・用量】**

開始治療時，通常成人一天 2mg，20~21 天後至少停藥一星期，然後將劑量減至一天 1mg。

本藥須由醫師處方使用。

**【禁忌】**

乳房及子宮之惡性腫瘤，懷孕。

**【警語】**

心血管疾病如瓣膜疾病，凝血異常，嚴重肝功能障礙須謹慎投與。

經期間出血時應查出隱藏的病因。

**【注意】**

若有動脈血管堵塞之虞，會隨著吸煙而加重。

突發的症狀伴有急性併發症必須停止治療：嚴重性頭痛，視覺障礙，血壓增高。

**【藥品相互作用】**

不建議併用下列藥物：

酵素誘導劑：抗痙攣(Carbamazepine、Phenobarbital、Phenytoin、Primidone)，Rifampicin，Griseofulvin，併用上列藥物會減少 Estradiol Valerate 治療效果。

**【副作用】**

噁心、頭痛、體重增加、乳房脹痛。

**【賦形劑】**

Lactose Monohydrate, Corn Starch, Povidone K-30, Talc, Magnesium Stearate.

**【包裝】**

2~1000 錠，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

G-5264  
衛署藥製字第 039822 號

**健喬信元醫藥生技股份有限公司**

藥商地址：303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠

製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號