

衛署藥製字第 042626 號 G-6479

柔他定錠 10 公絲 (樂雷塔定)

Finska Tablets 10 mg (Loratadine)

網號：C59

本劑主成分 Loratadine 是一種較新的強力長效型三環抗組織胺，具有專屬性全身周邊組織 H₁ 接受體的拮抗作用，為一種長效型無思睡作用之第二代抗組織胺製劑，因為其無 Carboxyethyl ester 結構，因此並不進入中樞神經作用，故不會有思睡的副作用。

成份：

Each Tablet contains : Loratadine 10mg

作用：

Loratadine 是一種長效型的抗組織胺製劑，經口服用後，會快速的被吸收，且迅速的轉變成活性代謝物(Descarboethoxyloratadine)，大約有 80% 的口服劑量於 10 天後，以代謝物的型式分布於尿及糞中。大約有 97% 的 Loratadine 會與血漿蛋白結合，Loratadine 並不會影響血漿蛋白與 Warfarin 及 Digoxin 的結合。由於其為專屬性周邊 H₁ 接受體的拮抗劑，且不具中樞神經作用，因此為不具思睡作用的第二代抗組織胺製劑。

適應症：

緩解過敏性鼻炎的相關症狀，如：鼻塞、流鼻水、搔癢及眼睛搔癢和灼熱感及緩解因慢性蕁麻疹及過敏性皮膚病所引起的症狀。

用法、用量：本藥須由醫師處方使用。

1.成人及 12 歲以上小孩：

每日一錠，於空腹時服用。

2.12 歲以下的小孩：

體重大於 30 公斤者：1 天 1 次，每次 1 錠。

體重小於或等於 30 公斤者：1 天 1 次，每次半錠。

副作用：

本劑並無明顯的思睡作用及抗膽鹼激素所引起的疲勞、思睡、頭痛等現象。由臨床試驗顯示，Loratadine 所產生的副作用與安慰劑並無差異。

禁忌：

對於本劑會造成過敏反應者，禁止使用。

藥物交互作用：

1.與治療劑量的 Erythromycin, Cimetidine 或 Ketoconazole 合併使用時，並無藥物相互作用發生。

2.當與口服避孕藥併用，並不會增加其副作用。

3.與酒精製品合併使用，並不會加強中樞神經的抑制作用。

注意事項：

1.對於六歲以下的小孩，服用本劑的效果及安全性尚未建立，故不建議使用。

2.對於懷孕期間的婦女安全性尚未建立，且因為本劑會由乳汁分泌，因此對於懷孕及授乳期婦女的使用要小心投與。

貯存：請貯存於室溫、陰涼、乾燥及小孩接觸不到之處所。

包裝：2~1000 錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

Size:130mm

內容一律黑色

E 版

92.08.22.