

“生達” **胃樂順** 凍晶注射劑20公絲
(發模梯定)

FADIN Lyo-inj. 20mg "Standard"
(Famotidine)

生達胃樂順凍晶注射劑為最新型之組織胺H₂接受體拮抗劑，不僅可以競爭性抑制組織胺作用於胃壁組織胺接受體所引起的基礎及夜間胃酸分泌，也可以抑制食物或五胃泌素(Pentagastrin)刺激所引起的胃酸分泌。本品之安全範圍大，臨床上，為胃、十二指腸潰瘍或出血之極佳治療劑。

成份：每Vial含：
Famotidine 20mg

作用特性：
1. 本品為強力長效之組織胺 H₂ 接受體拮抗劑，靜脈注射後30分鐘即可達最大效用，單劑量注射 1 Vial 後，可抑制夜間胃酸分泌達12小時之久。

2. 本品對男性荷爾蒙及藥物代謝酵素皆沒有阻礙作用。
3. 安全性極大，且重覆使用後亦無積蓄性。
4. 不會影響胃排空時間及胰臟之外分泌功能。
5. 本品對胃酸之基礎分泌，各種刺激分泌、夜間分泌皆有抑制作用。
6. 本品對十二指腸患者胃液中之粘液物質濃度沒有影響。


適應症：
住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的)十二指腸潰瘍、或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。

用法用量：
1日2次，每次20mg溶解於20ml生理食鹽水或葡萄糖水注射液，立即使用，施以靜脈緩慢注射。或混合於靜脈輸液中點滴注射。本藥限由醫師使用。

注意事項：
一、一般注意事項
治療期間應仔細觀察，依病狀輕重使用治療所需之最少劑量。如果沒有效果，請改用其他療法。

二、下列患者，須慎重投與
1. 有藥物過敏症既往歷之患者。
2. 腎不全或肝障害之患者。

- 三、副作用
1. 過敏症：偶有發疹、皮疹、蕁麻疹(紅斑)等症狀。當這些症狀出現時，請中止投與。
 2. 血液：偶有白血球減少的現象。
 3. 消化系統：偶有便秘、下痢、軟便、口渴、噁心、嘔吐等，腹部膨脹感、食慾不振等則極罕有。
 4. 循環系統：少有脈搏數增加、血壓上昇、耳鳴、顏面潮紅等。
 5. 肝臟：偶有S-GOT，S-GPT上昇等肝機能異常現象。
 6. 精神神經系：偶有全身倦怠、無氣力感、極罕有頭痛等。
 7. 其他：少者月經不順、顏面浮腫等。



胃樂順

- 四、對於懷孕中投與之安全性尚未建立，因此孕婦或可能懷孕的婦女，最好不要投與。又本藥會移行至母乳之中，因此若投與授乳中之婦女，應注意不要授乳。
- 五、小兒使用的安全性尚未建立。
- 六、本劑會遮蔽胃癌引起的症狀，因此應確認病症為非惡性後始行投與。

包裝：100 Vial以下盒裝。
賦形劑內容：L-Aspartic acid
Glycine
衛署藥製字第032990號 G-1996 Code. NO. IF-01 2213400



PIC/S GMP藥廠·ISO 9001
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號

S1502

S0212