

伏順 膜衣錠200毫克

Foxate F.C.Tablets 200 mg

【說明】

本品可以對泌尿生殖道上的平滑肌發揮鎮痙功能。可用於神經性頻尿、慢性前列腺炎、慢性膀胱炎之頻尿、殘尿感。

【成分】

每錠中含有 Flavoxate Hydrochloride.....200 mg。

【適應症】

神經性頻尿、慢性前列腺炎、慢性膀胱炎之頻尿、殘尿感。

【用法·用量】

一般劑量為每次一錠，每天三～四次。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

有下列病例者勿使用本藥：

- (1) 對本品敏感者。
- (2) 有幽門及十二指腸的阻塞、腸阻塞等疾病之患者。
- (3) 有胃腸出血者。
- (4) 下尿道泌尿器阻塞疾病之患者。

【警告】

1. 帶有泌尿生殖道的併發感染的病患，本品應該和抗感染藥物搭配治療。
2. 青光眼患者應慎用。
3. 操作機械及從事於須全神貫注的工作時，須特別注意，本藥可能引起的昏睡及視力模糊。

【孕婦的使用】

孕婦用藥分級：B

動物實驗證實對胎兒無害但缺乏足夠的孕婦實驗；或動物實驗有副作用報告，但孕婦實驗無法證明對懷孕初期及後期之胎兒有害。然而，在懷孕期間，假如要和其他藥品一起服用必須要小心，尤其在懷孕的前三個月。

【兒童】

由於 12 歲以下兒童的安全性及效能尚未被證實，因此 12 歲以下的兒童，不應該服用此藥。

【副作用】

服用本品偶而會有噁心及嘔吐的現象（飽胃之後，此現象可能減緩）；會有昏昏欲睡的感覺（減低用量或減低服藥的次數，現象可能減緩）；會有口乾、視力模糊、眼睛張力增加、心跳加速或心悸等現象。高劑量會造成便秘。

【貯存條件】

請置於緊密、避光的容器中，貯存於 30°C 以下。

【賦形劑】

Lactose Monohydrate、Cellulose Microcrystalline、Sodium Starch Glycolate、Povidone K-30、Magnesium Carbonate Heavy、Talc、Magnesium Stearate、HPMC 615、PEG 6000

【包裝】

6～1000 錠，塑膠瓶、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-7582 號
044572

健喬信元醫藥生技股份有限公司

健喬廠 303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號