

補血劑

“強生”葉酸膜衣錠 5毫克

FOLACIN F.C. TABLETS 5mg "JOHNSON"
(Folic Acid)

衛署藥製字第034670號(G-2638)

【成分】 每錠含有：

Folic Acid 5mg

【賦形劑】 Corn Starch、Dicalcium Phosphate Dihydrate、Hydroxypropyl Methylcellulose 606、Magnesium Stearate、Polyvinylpyrrolidone K30、Silicon Dioxide、Sodium bicarbonate、Sodium Starch Glycolate、Talc、Tartrazine Aluminum Lake、Titanium Dioxide

【作用】 本劑是保持人體組織正常發育及機能不可缺少的物質，尤其與紅血球的正常形成息息相關，於罹患巨赤芽球形貧血症時，本劑能使網狀紅血球與紅血球成熟，於罹患白血球減少症時，能刺激骨髓而增加白血球。本劑由於Uracil(尿嘧啶)中間體生成Zymin(酵素)等重要的Purine(嘌呤)與Pyrimidine(嘧啶)化合物時具有作為補酵素的作用，Zymin(酵素)會被維他命B₁₂轉變為核酸與核蛋白之要素的Thymidine(三氫胸腺嘧啶脫氧核苷)。據報告指出，缺乏本劑與維他命B₁₂時會阻止骨髓成分之成熟，本劑在肝臟內能促進維他命B₁₂之合成，而維他命B₁₂則能助長葉酸之生成，尤其本劑對於胃腸粘膜的機能具有特殊影響，故對於治療貧血常會併發的舌炎與腹瀉有效。

【適應症】 惡性貧血、妊孕性貧血、小兒巨大紅血球貧血及骨髓增生或衰退引起之貧血。

【用法、用量】 成人：起始量1天3次，1次1錠，服用14天或至病情改善，維持量1天1錠，服用1~7天。
兒童：起始量1歲以下0.5毫克/每公斤體重，1~5歲每天1錠，6~12歲每天2錠，維持量為起始量之半量。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】 ① 一般注意事項：惡性貧血患者投與時能改善血液狀態，但對於神經症狀則無效，故惡性貧血患者應與維他命B₁₂製劑併用，且惡性貧血患者於未經診斷確定前投與時，因會改善血液狀態而隱藏惡性貧血以致影響診斷與治療，應請注意。

② 副作用：

- (A)胃腸：有時會有食慾不振、噁心等症狀。
- (B)過敏症：有時會有紅斑、搔癢感、全身倦怠感等過敏症狀，如有發生請即停止服用。
- (C)其他：浮腫，有時會有體重減輕現象發生。

【儲存】 本藥應儲存於25℃以下緊密容器。

【包裝】 6~1,000錠 塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。



Code No.:O-45

強生化學製藥廠股份有限公司
JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號
訂貨專線:(02)29894756 FAX:(02)29712579
工廠電話:(02)22878405