

"惠勝"固胃錠

Gowell Tablets "WECAM"

本劑中主成分之 Dihydroxyaluminum allantoinate 係西元 1968 年 Turner 應用於治療吐血患者之 Allantoin 經 Cohen 等合成之一連串 Allantoin 衍生物中之一種，該劑對肉芽組織有再生作用，對壞死組織具有清除作用，對炎症性粘膜具有保護作用，並能使傷口收斂，故被應用於消化性潰瘍療效頗佳，另再配合新制酸劑 Metamagnesium alumino silicate 具有適度之制酸作用，故能發揮兩種藥品之相加作用，誠為治療胃炎及消化性潰瘍之優異藥劑。

【成分】：每錠中含有：

Dihydroxyaluminum allantoinate 50mg
Metamagnesium alumino silicate 450mg

【作用特點】：

1. 本劑能促進微血管的再生，強化血管並改善患者血液的循環，故具有止血作用。
2. 本劑能清除壞死組織及其分泌物，促進新鮮肉芽組織之增殖，促進潰瘍面之癒合。
3. 本劑具有抗 Pepsin 作用，抑制 Pepsin 對消化管道之自體消化。
4. 本劑之制酸力極強，且在胃內之中和作用甚快，屬於速效性制酸作用，同時服用後能保持胃內酸度在最適宜之狀態（即 PH3 ~ 5 之間）。
5. 本劑遇胃酸後有緩衝性作用，其反應生成物為非吸收性，故連用或大量使用亦不致引起類似 Sodium bicarbonate 之 Alkalosis 現象或因 Alkali 作用而發生之二次性酸分泌作用。
6. 本劑無 Aluminum hydroxide gel 之便秘作用，亦無 Magnesium Carbonate 之緩瀉等副作用。

【適應症】：胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急、慢性胃炎。

【用法用量】：通常成人每次 2 錠，一日三次於飯後服用或依年齡適宜增減之。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

(1) 慎重投藥：

- ① 有心機能障礙的患者。
- ② 高鎂血症患者。
- ③ 高齡者生理機能降低，代謝異常。
- ④ 有腎功能顯著受損患者，腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症 (Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變 (Dialysis encephalopathy) 及低磷血症，應謹慎小心使用。

(2) 相互作用：

- ① 因會阻礙四環系抗生素的吸收，故請勿同時服用。
- ② 因為本藥的吸附作用或消化管內。體液的 PH 上升，有時會影響併用藥劑的吸收及排泄，故應慎重投藥。

(3) 副作用：

- ① 代謝異常者：因為長期大量投藥，會有出現過高鎂血症，故應充分進行觀察，當有異常時，應減量或停藥等做適當的處置。
- ② 胃腸：偶而出現便秘、胃部不快感、食慾不振、腹瀉等症狀。

【賦形劑】 Corn Starch、Sucrose、Menthol、Strawberry Essence、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Sodium Saccharin、Erythrosine、Lactose、Corn Starch、Povidone。

【包裝】：12 ~ 1000、2000 錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

儲藏於 25 °C 以下

衛署藥製字第 044977 號



永勝藥品工業股份有限公司 製造廠
嘉義頭橋工業區工業三路6-3號



惠勝藥品股份有限公司 委託者
嘉義市公園街159號8F之2
諮詢電話：0800-828168