

樂癒痔軟膏

High-Xylmol ointment “Sinphar”

-外用痔疾治療劑-

成分：每公克軟膏中含有：

Lidocaine Hydrochloride.....25mg

Phenylephrine Hydrochloride.....1mg

Betamethasone Valerate.....0.5mg

賦形劑：

White Petrolatum、Polyoxyl Stearate、Cetyl Stearyl、Alcohol、Propylene Glycol、Hydroxyethyl Cellulose、Camphor、Menthol、Water Purified

作用：

Betamethasone 之抗炎症及抗過敏作用為 Cortisone 之 40-50 倍，Prednisolone 之 8-10 倍，又其用量比 Dexamethasone 少即可發揮其功效。Betamethasone Valerate 為其專使用於外用、局部用之衍生物、除了具有抗炎症及抗過敏作用外，同時也是所有 Corticosteroide 中惟一具有消除外痔核之藥物。(日本最近之新藥 29 集 P.48 藥效再評價第 11-13 次判定結果)。Lidocaine Hydrochloride 具表面麻醉作用，可輕緩外痔疼痛及肛門搔癢症。Phenylephrine Hydrochloride 其末梢血管收縮作用可以抑制痔出血。三種藥物合理地配合，使本藥具有消炎、止痛、止癢、止血及消除痔核等作用。

適應症：

外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門裂創、肛門周圍炎、肛門搔癢症、肛門濕疹、肛門潰瘍。

用法用量：通常一天 2-3 次，使用前先將患部洗淨，再以適量軟膏直接塗佈於患部即可；本藥可使用於直腸內。

注意事項：

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 2 歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

本藥須由醫師處方使用

衛部藥製字第 058209 號

儲存：25°C 以下室溫保存

G-12222 號

包裝：1000 公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝。