

體液補充劑

"南光"哈得滿賜注射液

Hatermas Injection "N.K."

衛署藥製字第 029061 號 G.M.P. : G-0390 號

目前的點滴液除了 Normal Saline Solution，Ringer's Solution 外，尚有眾多的類似品，其中以 Hartmann Solution(Ringer-Lactate Solution)，因最接近血漿與細胞外液之電解質組成，更配合了能產生足夠之能量且糖尿病患亦適用之 D- Sorbitol。所以，當有體液大量喪失之情形時，例如手術、出血、休克等等，本品除能適切補給水分、電解質外，更有糖質以便維持體能，故誠為一種完美的體液補充液。

「成分」:Each ml contains:

Sodium chloride	6mg
Potassium Chloride	0.3mg
Calcium Chloride Dihydrate	0.2mg
Sodium Lactate	3.1mg
D-Sorbitol	50mg

「適應症」:

手術中、手術後及急救時之水分、電解質、能量補給；代謝性酸中毒之矯正。

「用法用量」:

本藥限由醫師使用。

每次 500-1000ml 點滴靜注，通常控制在每小時約 200ml 之速度。得視年齡、症狀、體重酌予增減用量。

「特點」:

- 1.本品因含 Sodium Lactate，在其體內能被代謝成 HCO_3^- 離子，故可矯正酸中毒(acidosis)。
- 2.D-Sorbitol 是一種還原性六碳糖，在體內只有小部分被轉變成 Glucose，大部分是被代謝成 CO_2 ，並產生能量，每公克(g)約能產生 4 Kcal，故本品 1 公升(liter)約能供給 200Kcal 之熱量。而且，在手術中或手術後並不妨礙其代謝；雖經高壓蒸氣滅菌亦是安

定的。

「注意事項」:

- 1.對高張性脫水症，閉塞性尿路疾患導致尿量減少之患者應慎重投與。
- 2.因含鈣離子，跟加有檸檬酸之血液混合時，會有凝血之虞；跟含有磷酸根離子、碳酸根離子之製劑配合時，會產生沈澱，故皆不可同時使用。

3.使用方法

(1)取用時:

- a.運輸過程中，容器可能因受重擊，震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動。若發現有上述情形時，請勿使用。
- b.若藥液有不澄清、變色，異物或其它異常現象時，請勿使用。

(2)輸液套選用及插入法:

- a.請依輸液套使用方法正確使用。
- b.請使用附有過濾裝置之輸液套，導人針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- c.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

「儲藏」:

室溫貯藏。

「包裝」:

100，250，300，500，1000 公撮玻璃瓶、塑膠瓶及塑膠軟袋裝，100 支以下盒裝。



南光化學製藥股份有限公司
台灣 台南縣新化鎮中山路1001號
TEL:06-5984121(代表) FAX:
06-5972033