

【成份】Each tablet contains:

Carisoprodol..... 175 mg
Acetaminophen..... 350 mg

【作用】依文獻記載

Carisoprodol 所產生之骨骼鬆弛作用，阻斷介在神經元基部的神經節，亦抑制腦幹網樣體的多突觸弓及腦皮質下的傳出路徑，及作用於中樞神經系統而除去疼痛，於脊髓產生選擇性的作用，但不會阻礙正常末梢的反射，可以改善骨骼肌之緊張力及運動不正常的現象，緩解因扭傷、骨折、脫臼、肌肉痙攣、強直等引起之疼痛。

臨床實驗於120個患者(其中18個神經痙攣現象、45個骨關節炎、4個坐骨神經痛及神經炎、35個椎間盤損傷、3個脊椎炎、15個背痛)分二組實驗，即一組用Carisoprodol另一組用Placebo治療，結果前者2/3有效，而後者有效只有1/4。

Carisoprodol 在同類製劑中副作用較小，不會引起口乾、潮紅、小便困難、食慾不振、胃腸道出血、便秘、下痢、黃疸、LD50腹腔790 mg/kg 安全範圍比Chlorzoxazone、Chlormezanone為大。

Acetaminophen能迅速抑制大腦興奮引起的痛覺，使中樞對疼痛之感覺遲鈍，亦會干擾下視丘與大腦皮質間痛覺衝動的傳遞，因而改變痛覺的反應，對CNS產生選擇性及有限制性的鎮痛作用。

【適應症】骨骼肌肉之異常緊張(包括外傷、扭傷、骨折、脫臼、肌炎、風濕性)所引起之各種症狀，如酸痛、痙攣、強直、僵硬。

【用法用量】通常成人一次1~2錠，一日4次(飯後及睡前)服用，依年齡症狀酌予增減之。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】1.本劑含有劇藥，應確實按照所定服用方法及劑量使用。

2.Acetaminophen：對老人或衰弱的病人，有嚴重的肝功能或腎功能不全等要特別注意。

3.Carisoprodol：Carisoprodol具積蓄性作用，應避免過度使用，特別是對有胃炎或胃潰瘍的病人宜特別注意。因本藥偶會引起身心不全，開車或操作機器者使用本藥宜特別注意。

4.在就診中尚使用其他解熱、鎮痛或感冒藥者應避免重複使用。

5.應用本劑數次仍未見症狀改善時應即停用。

6.避免長期使用。

7.本劑應置於小孩伸手不及處。

【禁忌】對Acetaminophen或Carisoprodol成分過敏者，請勿使用。

【副作用】1.Acetaminophen一般會頭暈、暈眩、噁心、嘔吐等，對中樞神經會引起心智不全、身心焦慮、害怕；長服用會便秘、尿道痙攣，皮膚發疹等。

2.Carisoprodol最常見的副作用為昏昏欲睡、皮疹、多形式的紅斑、搔癢等。

【警語】1.Acetaminophen：如果每天喝酒3杯或更多之酒精性飲料，詢問你的醫師是否可服用Acetaminophen或其他解熱鎮痛劑。Acetaminophen可能引起肝臟損害。

2.Carisoprodol：

(1)一般極其罕見使用於第一劑量時，數分鐘至數小時有症狀的特異反應，此反應包括身體極端虛弱、暫時性的四肢麻痺、頭暈、運動失調、暫時性的視覺模糊、複視、攪動感、欣快感、迷糊失去方向感。

(2)與酒精、其他CNS抑制劑或影響精神的藥物共同服用，可能有加成作用。

【賦形劑】Lactose monohydrate、Carboxymethylcellulose calcium、Primojel、Magnesium stearate、Microcrystalline cellulose、Povidone K-30。

【包裝】8-1000錠塑膠瓶裝，PTP鋁箔盒裝。

【儲存條件】儲存於25°C以下。避光儲存。

