
“信東” **乳酸林格爾** 注射液

Lactated Ringer's Injection “S.T.”

【成分】

每 ml 中含有：

氯化鈣 (CaCl ₂ · 2H ₂ O)	0.2mg
氯化鉀 (KCl)	0.3mg
氯化鈉 (NaCl)	6mg
乳酸鈉 (C ₃ H ₅ NaO ₃)	3.1mg

乳酸林格爾注射液之組成分與細胞外液 (extra-cellular fluid) 之成分很相近，故常用於體液或體內電解質不足之補充。由於其組成分 Sodium Lactate (乳酸鈉) 在體內產生代謝物 Bicarbonate 所以常被用於 metabolic acidosis (代謝酸中毒) 之治療。

近來有人用於因火傷、手術，或外傷失血過多，血漿之代用品。尤用於火傷傷患休克之急救更為實際，因火傷患者，失血 (血球之減少) 較少，而血漿流失較多時，不宜輸全血，免得引起輸血之不良反應或因輸血所引起之傳染性肝炎。

(The Medical Letter, Vol. 8, No. 7, April 8, 1966)

【適應症】

火傷、手術、外傷失血過多、血漿之代用品等。

【用法·用量】

1 次 500ml 靜脈注射或皮下灌注。

本藥限由醫師使用。

【注意】

- ①如瓶內有不潔或混濁物存在或不呈真空時，即不能使用。
- ②如有類似過敏之反應，即停止使用。

【使用之注意事項】

(一) 取用時：

- 1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
- 2.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(二) 輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
- 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割 (coring) 產生碎片。
- 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【包裝】

玻璃瓶：250ml, 500ml, 1000ml

塑膠瓶：500ml, 1000ml

塑膠軟袋裝：500ml, 1000ml

內衛藥製字第 000577 號



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路 22 號

IL 015©

