

克菸咀嚼錠

(清涼薄荷) 2毫克 / Nicotinell Cool Mint 2mg Chewing Gum

克菸咀嚼錠

(清涼薄荷) 4毫克 / Nicotinell Cool Mint 4mg Chewing Gum

衛署藥輸字第024457號
衛署藥輸字第024499號

[劑 型] 本品為咀嚼錠，每錠含 nicotine 2mg或4mg。

[賦 形 劑] Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol Powder, Xylitol Crystals, Sodium Carbonate Anhydrous, Sodium Hydrogen Carbonate, Natural Mint Flavouring, Amberlite, Glycerol, Mint Millicaps, Purified Water, L-Menthol, Sucralose, Acesulfame K, Mannitol, Gelatin, Titanium Dioxide, Carnauba Wax, Talc, Xylitol.

[適 應 症] 戒菸輔助劑。

[效 用] 本品能減輕因戒菸所產生的戒斷症狀，使戒菸者更能全力達成戒菸的目標。由於本品不似香菸，因此可以很快的停癮。個人意志力是否堅定與成功有很大的關聯，本品能提供相當有效的幫助。治療中，請確實聽從醫師指示。

[類 別] 醫師藥師藥劑生指示藥品。

[用法用量] 成人：用量因人而異，一般皆以2mg錠開始使用，每天8~12片。但菸癮較大者，則使用4mg錠。治療期間因人而異，但臨床經驗顯示應至少使用3個月以上。應逐漸減低劑量。當每日使用量少於1~2片時，應停止治療。不建議服用超過一年。
兒童：不可用於兒童。

[用法步驟] 為了避免戒菸產生戒斷狀態，或者當菸癮來時立刻使用，應緩慢咀嚼30分鐘，nicotine會完全釋出。

Nicotine是經由口腔黏膜吸收，若吞入過多的尼古丁，不但會造成胃部不適且浪費，因此不要咀嚼過快。

只要按照以下說明使用一兩天，你會習慣正確的咀嚼速度。

以下提供你使nicotine發揮最大的功效且避免咀嚼過快的副作用，這需要你幾天的時間來適應它的味道，請耐心使用。

1. 將一片置於口腔，緩慢的咀嚼，每嚼一次休息數秒。
2. 照這樣約嚼10次後，將其放在舌下或兩頰含著約1至2分鐘。
3. 再咀嚼10次，再次含著。
4. 反覆上述步驟約30分鐘。
5. 當你習慣它的味道後，可根據你的需要調整咀嚼速度。

[禁 忌] 胃潰瘍、心絞痛、心肌梗塞、食道炎、下顎關節疾病、孕婦。

[副 作 用] 大部分的副作用出現在治療初期，多是由於不正確的咀嚼步驟，或者是nicotine的局部或全身性的藥理反應，這跟你服用劑量有關。

[注意事項] 某些徵狀—如刺激性、睡眠障礙與頭重腳輕—只要nicotine量降低時，上述症狀立刻消失。在戒菸過程中曾有出現口腔潰瘍的報告，這與nicotine治療方式無關。未滿十八歲者，或懷孕及正在哺乳的婦女，若無醫師的指示下請勿使用，在使用本產品前請諮詢你的醫師、藥師或護理人員。

發生率：較常見 (> 1/100)

中樞神經系統：頭暈、頭痛

胃 腸 道：噁心、腸胃不適、打嗝、下顎肌肉疼痛、咽痛或口腔炎。

其 它：戒菸後對nicotine仍具有依賴性。本品有可能黏牙，但很少會傷害到齒列。

發生率：少見 (1/100~1/1000)

心 血 管：快速或不規則的心跳。

皮 膚：紅斑、蕁麻疹。

發生率：罕見 (< 1/1000)

心 血 管：可恢復的心房顫動。

[警 告] 請置於兒童無法取得之處。

[包 裝] 2~1000錠鋁箔盒裝。

[貯 存] 25°C溫度下避熱貯存。

製造廠/分裝廠：FERTIN PHARMA A/S

地 址：Dandyvej 19, DK-7100 Vejle, Denmark

包裝廠：新竹物流股份有限公司

地 址：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號

藥 商：英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司

地 址：台北市忠孝西路一段66號24樓

消費者諮詢專線：0800-212259

本藥品為醫師藥師指示用藥

Nicotinell及克菸為葛蘭素史克集團所有或經授權的商標 ©2017 GSK group of companies. All rights reserved.