

Perioxidin
Bioadhesive
GEL

樂利口
抗炎凝膠

不含酒精
衛部藥輸字第 026152 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

【功效】

牙菌斑是造成牙周病的主要原因，不僅造成牙齦炎（牙齦腫脹、流血）甚至是牙周炎，其影響會擴及牙周韌帶及骨頭組織。
Chlorhexidine 可作為口腔內之殺菌、消毒之用。

【有效成分及含量】

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 2 毫克/克

【其他成分(賦形劑)】

Propylene glycol, sorbitol, glycerol, hydroxyethyl cellulose, polyoxyethylene hydrogenated castor oil, aromatic agent, menthol, acesulfame potassium, methyl salicylate, purified water

【用途(適應症)】

口腔內之殺菌、消毒。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾對本藥成分過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師、藥師、藥劑生：
 - (1) 正在使用任何藥品，包括不是經醫師處方之藥品。
 - (2) 曾有藥物過敏體質的人。
 - (3) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 其他使用上注意事項：
 - (1) 本藥僅用於口腔衛生用途。
 - (2) 請勿放置在兒童視線所及與伸手可拿之處。
 - (3) 請勿吞食。
 - (4) 使用時請遵守用法及用量。
 - (5) 避免陽光直接照射。
 - (6) 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。
 - (7) 長期使用本產品並接觸某些成分如茶、咖啡、酒和煙等，會造成牙齒表面變黃。顏色變化是表面的，藉由牙醫診所的潔牙技術即可輕易去除。
 - (8) 長期使用可能會產生暫時性的味覺改變。

【用法用量】

劑量及使用次數	建議一天使用本品兩到三次，每次 0.5-2 克 (相當於 1-4mg 之 chlorhexidine digluconate)
使用方式	可用手指或套管沾取適量本品直接塗抹於牙齦與牙齒交接處(齒齦溝)，以指尖輕柔地按摩，本品會在牙齒和牙齦之間形成一道保護膜。並配合正確的衛生習慣。使用完本品後半小時內應避免進食及喝飲料。睡前使用效果最佳。使用後請勿漱口及請勿吞服。使用本品後，在進食前請先清潔口腔，以避免食入殘餘藥物。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
口腔	刺激感、過敏性反應

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 使用數日後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】

1000 公克以下鋁管裝。

【儲存條件】

本藥之架儲期為 4 年 (儲存溫度為 25°C 以下)。

請存放於乾燥通風處。

製造廠：LACER, S.A.

廠址：C/Boters, 5, Parc Tecnològic del Vallès, 08290 Cerdanyola del Vallès- Barcelona, Spain

藥商：元聖企業股份有限公司

地址：台北市民權西路 27 號 5 樓之 1



