

普克胃 注射液

Promeran Injection

使用含metoclopramide成分藥品可能造成遲發性運動障礙 (tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性，且分析本品之使用型態，約20%病人使用超過12周，故不建議長期(超過12週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生tardive dyskinesia之風險者。

臨床常見的各種消化系統不安定症狀，如食慾不振、腹部膨脹、噁心、嘔吐、嘔酸等都是由於消化系統，尤其是胃及十二指腸的運動機能異常所致。本劑主成分Metoclopramide係Benzamide之誘導體，於治療消化系統機能異常之臨床運用上，已被確認具有優異之效果。

成分：每ml含
Metoclopramide HCl · H₂O 4.54mg
(equ. to 3.84mg of metoclopramide base.)

- 藥理作用：
1. Metoclopramide 能使胃之運動亢進，促進胃內物質排出，同時能使十二指腸擴張使其運動亢進，而促進內含物之通過。
 2. Metoclopramide 不論對中樞性或末梢性嘔吐，皆有特別效力，其對於 Apomorphine 之拮抗作用，注射時為 Chlorpromazine 之19倍，口服時則為其35倍，故對於各科領域之噁心及嘔吐具有卓效。
 3. 本品具有選擇性作用，對於胃液之分泌及酸度沒有影響，故對於過敏性或無酸性胃腸障礙者皆可使用。
 4. Metoclopramide異於 Phenothiazide 類之誘導體或精神安定劑，對中樞神經系統幾無作用。
 5. 本品對循環系統無影響。
 6. 本品之有效劑量係中毒量之1/100~1/1000，故治療之安全域廣泛，且容忍性良好，殆無副作用。

適應症：預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

用法用量：通常成人每次2ml，每日1~2次，肌肉或靜脈注射。
兒童按年齡、體重、症狀每日1次，每次0.5 ml至2ml，行肌肉或靜脈注射。本藥限由醫師使用。

注意事項：注射液在使用後，極少數兒童發生嗜睡或輕微肌肉緊張，此種現象為暫時性，停止用藥，保持安靜，症狀即會消失。懷孕用藥分級 B：動物實驗證實對胎兒無害但缺乏足夠的孕婦實驗；或動物實驗有副作用報告，但孕婦實驗無法證明對懷孕初期及後期之胎兒有害。

警語：投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用metoclopramide藥品相關的不良反應如肌張力失調(dystonias)及錐體外路徑反應(extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。

賦形劑內容：Sodium chloride、Benzyl alcohol、Potassium phosphate monobasic、Sodium hydroxide、Water for injection

儲藏條件：儲存於避光，室溫環境下。

包裝：2mlX100安瓿盒裝。

衛署藥製字第003552號 Code No.IP-02 2213290



PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號