

# 認識性傳染病

## 性傳染病是什麼？

性傳染病是指經由性行為所傳染的疾病，例如愛滋病、梅毒、淋病等。

## 性傳染病是如何傳染的？

### ● 性 行 為：

透過與性傳染病感染者發生肛門、陰道及口腔等方式的性行為而傳染。

### ● 血 液 傳 染：

經由輸血、共用針頭、針具等方式傳染。

### ● 母子垂直感染：

若孕婦感染梅毒或愛滋病毒，則可經由胎盤或產道傳染給胎兒；淋病亦可經由產道傳染給嬰兒引起結膜炎，並可能造成失明。



## 預防性傳染病三部曲

1 避免多重性伴侶或與性生活史不明的對象發生性行為。

2 發生性行為時，請全程正確使用保險套和水性潤滑液。潤滑液切不可使用嬰兒油、乳液等油性潤滑液，以免造成保險套破損。

3 「友善性傳染病門診」係疾病管制署和泌尿科、皮膚科、家醫科及感染科醫學會共同建立之可信賴醫師名單。當您有相關症狀或疑慮時，可以選擇離自己較近的醫療院所接受諮詢或治療。詳細名單請至疾管署網站(<http://www.cdc.gov.tw>)查詢。



## 洽詢友善性傳染病 門診醫師名單

► 請撥免付費洽詢專線：

**1922**

► 請連結友善性傳染病門診醫師  
名單網站



## 如何知道是否感染愛滋病毒？

從外觀是無法判斷一個人是否感染愛滋病毒，經由抽血檢驗是確認有無感染病毒的最好方法。目前可以西方墨點法（WB）及分子生物學核酸檢測（NAT）確認。

所以，民眾應定期進行愛滋病毒感染風險之自我評估，並依評估結果進行篩檢，才能早期發現，早期接受治療。



## 您是否有需要進行愛滋病毒檢驗？

### 愛滋病毒感染風險 自我評估表

1 是否曾經得過梅毒、淋病、披衣菌感染或其他性傳染病？

0)是  1)否

2 是否曾有注射毒品藥物或與他人共用器具(如針頭、針筒)之行為？

0)是  1)否

3 是否曾使用過成癮藥物(包含K他命、搖頭丸、安非他命等)？

0)是  1)否

4 是否曾與一個人以上發生未採保護措施的性交行為？(註：性交行為—包含陰道性交、肛交、口交等)

0)是  1)否

5 是否曾與可能感染愛滋病毒者發生未採保護措施的性行為？(註：可能感染愛滋病毒者—如性伴侶為感染性傳染病者、多重性伴侶者或與陌生人發生性行為者等)

0)是  1)否

※若有一個以上的答案是肯定的，則有感染愛滋病毒的風險。建議您在本院(所)接受愛滋病毒篩檢或至全國匿名篩檢醫院接受愛滋病匿名篩檢，倘若證實感染，請至全國愛滋病指定醫院接受治療。



# 認識 性傳染病



衛生福利部疾病管制署 關心您