

# 帶狀疱疹疫苗



帶狀疱疹是疼痛性皮疹，可導致長期神經痛  
接種帶狀疱疹疫苗，有效預防帶狀疱疹與神經痛

年齡：

50+

歲以上

2劑：



間隔 2-6 個月

費用：

自費

約9千元/每劑 X2劑

## ◎疾病簡介

- 帶狀疱疹為潛伏體內的「水痘-帶狀疱疹病毒」再活化的表現。



估計約三分之一的人會發生帶狀疱疹，台灣每年病例數達 12 萬人。



急性發作期造成單側性、疼痛性、水泡性皮疹，持續約數周。  
部分病患留下皮膚疤痕、或併發帶狀疱疹後神經痛。



發作在私密部位可能導致大小便失禁，發作在眼、鼻周圍更有失明的風險。

- 帶狀疱疹好發於 50 歲以上、及免疫低下之民眾。
- 曾經得過帶狀疱疹者，痊癒後仍有再復發的可能性。

## ◎認識疫苗

接種帶狀疱疹疫苗是預防帶狀疱疹及相關併發症最有效的方法，國內目前皆為自費接種。本院目前備有非活性帶狀疱疹疫苗（註），完整接種2劑後之保護力超過九成。

## ◎自費接種建議

50歲以上成人、18歲以上免疫功能低下者，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，建議接種2劑非活性帶狀疱疹疫苗，間隔 2-6 個月。

### ◎接種禁忌

先前接種非活性帶狀疱疹疫苗、或對此疫苗的任何成份曾發生嚴重過敏者。

### ◎注意事項

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

懷孕婦女應避免接種。

### ◎接種後可能發生的反應

注射部位可能有發紅、疼痛或腫脹等局部反應。可能有頭痛、肌肉痠痛、發燒、疲倦等全身性反應。

### ◎常見問題

**Q：**已發生過帶狀疱疹者，是否還需要接種疫苗？應該何時接種？

**A：**發生過帶狀疱疹者，短期內復發機率低，但長期仍有再復發的風險，故可考慮施打帶狀疱疹疫苗。

但不應該在急性發作期施打帶狀疱疹疫苗。

**Q：**已接種過活性帶狀疱疹疫苗的族群，是否還能接種非活性疫苗？

**A：**接種過活性帶狀疱疹疫苗之民眾，可再接種非活性疫苗。

美國疾病管制中心建議，至少間隔八週。

註：「非活性帶狀疱疹疫苗」，又稱「非活性基因重組帶狀疱疹疫苗」，或「非活性重組帶狀疱疹疫苗」

參考資料：1. 衛生福利部疾病管制署 - 帶狀疱疹疫苗 2. 臺灣皮膚科醫學會帶狀疱疹疫苗接種建議 3. 美國疾病管制中心 - 非活性帶狀疱疹疫苗