

雙胍類

biguanide

控血糖效果 ★★★

低血糖風險 ★☆☆

服藥時機



副作用



注意事項



手術前使用
含碘顯影劑
需停藥

腸泌素分解酶抑制劑

DPP - 4 inhibitor

控血糖效果 ★★☆☆

低血糖風險 ★☆☆☆

少見副作用

水泡、皮膚
或口腔黏膜潰爛



排糖藥

SGLT-2 inhibitor



多喝水
要清潔
不憋尿

控血糖效果 ★★☆☆
低血糖風險 ★☆☆☆

服藥時機



好處

心腎保護



體重減輕



副作用



降低
血壓

尿路
發炎

注意事項



手術前建議
停用三天

促胰島素分泌劑

meglitinide/sulfonylurea

控血糖效果 ★★★
低血糖風險 ★★★

服藥時機



副作用

.....

未隨餐吃易低血糖



體重增加

醣類消化酶抑制劑

alpha-glucosidase inhibitor

副作用


腹瀉

腹脹



排氣增加

注意事項



低血糖時

使用葡萄糖
或低脂牛奶

控血糖效果 ★★☆☆

低血糖風險 ★☆☆☆

服藥時機



胰島素

insulin




體重增加


控血糖效果 ★★★

低血糖風險 ★★★

注意事項



輪替注射部位



停留十秒



每次更換新針頭

腸泌素類似物

GLP-1 receptor agonist

好處

心腎保護

體重減輕




副作用

注意事項

抑制食慾

使用期間須避孕



脹氣

腹瀉

服藥時機

控血糖效果 ★★★

低血糖風險 ★☆☆

瑞倍適



30分鐘

胰島素增敏劑


thiazolidinedione

控血糖效果 ★★★

低血糖風險 ★☆☆

副作用

體重
增加



下肢
水腫