

抗癲癇藥

7A病房關心您


簡介

▶ 作用：

降低癲癇發作次數或降低發作嚴重度

▶ 副作用：

嗜睡、疲倦、
體重增加、皮膚紅疹、胃腸不適



Keppra 優閒



Depakin 帝拔癲



Clonopam 克癩平錠



Dilantin 癲能停膠囊



Tegretol 癲通



護理指導

- ▶ 瞭解**規律服藥**的重要性，養成按時服藥與正常規律生活作息的習慣。
- ▶ 於**餐前或餐後一小時服用**，避免與其他藥物同時服用，與其他藥物之間建議**間隔一小時**。
- ▶ 避免過度勞累或劇烈運動，以穩定情緒。
- ▶ 避免過多刺激性的飲料：如咖啡、茶

護理指導

- ▶ 可能出現**頭暈、嗜睡、四肢無力**情形，須注意步態不穩，盡量臥床休息，家屬陪伴，**避免跌倒**。
- ▶ 避免一次喝大量的水，**過多的水分**會造成腦水腫，低血鈉也會引起癲癇發作。
- ▶ 服用抗癲癇藥物初期會想睡或噁心的副作用，待血中濃度達穩定時，這些現象可獲得改善。

用藥安心諮詢專線

- ▶ 如用藥問題，可撥打陽明院
區藥劑科諮詢專線
2535-3456轉(日)6123(夜)6175

