

血糖藥

7A 病房關心您

簡介

▶ 作用：
降血糖

▶ 副作用：
血糖過低、胃部不適、皮膚疹或搔癢、體重增加



C.T.L XR 驅糖樂長效錠



Deglu 抵克醣錠



Amaryl 瑪爾胰錠



Galvus 高糖優適錠



Januvia 佳糖維膜衣錠



護理指導

- ▶ 如需進行任何手術、住院或門診時，應主動告知醫師您所有服用之降血糖藥物，並勿擅自服用未經醫師許可之藥物。
- ▶ 您曾對磺胺類藥物（sulfa-type）過敏或有肝、腎疾病者應於服藥前主動告知醫師。
- ▶ 服藥期間飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食、飲酒、或過度運動會引起低血糖。

- ▶ **服藥期間如有高血糖症狀**（極度口渴、多尿、皮膚乾燥、複視、噁心嘔吐等）或曾出現**低血糖症狀**（極度飢餓、焦慮、皮膚蒼白、冒冷汗、視力模糊或意識混淆等）時，**應於回診時主動告知醫師，以利劑量之調整。**
- ▶ **請確實遵從醫囑回診及實行相關檢驗，**如：血糖、尿糖，以便醫師評估療效或調整劑量。

用藥安心諮詢專線

▶ 如用藥問題，可撥打陽明院
區藥劑科諮詢專線

2535-3456 轉

(日)6123(夜)6111

