

痰液檢查採檢 Sputum examination inspection

一、目的：

- (一) 檢查痰液一般的性狀，是否有血絲、膿液
- (二) 作細菌培養、細胞學等檢查

二、方法：

- (一) 收集早晨起床後未清潔口腔與進食前的第一口痰；可以先以冷開水漱口，但不可以刷牙或使用漱口水
- (二) 把採集瓶的瓶蓋打開時，注意雙手不要觸碰到瓶子及瓶蓋內部
- (三) 咳痰時應用力咳出肺部深處的痰，而不是咳出唾液（口水）或喉頭分泌物
- (四) 痰液量應儘量不少於 5c.c.，咳到檢驗瓶後，請蓋緊瓶蓋，盡快送至護理站

三、採檢步驟：



步驟一
請把採集瓶的瓶蓋打開。

步驟二
請注意：手不要觸碰到瓶子及瓶蓋內部。

步驟三
將痰液直接咳入採集瓶內。

步驟四
痰液咳入採集瓶後，請將瓶蓋鎖緊，避免痰液流出。

步驟五
放入夾鏈袋中。

步驟六
壓緊夾鏈袋封口處，儘快送到衛生所（醫院）。

四、參考資料

林韻純、羅曉萍、賴玟卉、廖淑櫻（2019）．提升痰液培養檢體採集品質
合格率．*榮總護理*，36（2），134-142。

李慶孝、王正光、王欣凱（2018）．*醫護檢驗手冊*，台北：永大。

No.H0203

臺北市立聯合醫院護理部 111 年 6 月 30 日修訂