

抗凝血劑

7A 病房關心您

簡介

▶ 作用：

在預防腦血管栓塞、心肌梗塞、靜脈栓塞症



▶ 副作用：

出血現象（例如：嘔吐

出血或類似咖啡渣的棕色物質、血便或黑

便、血尿、紅色或暗棕色尿、突然出現瘀傷、牙齦出血）、頭

痛、

倦怠、皮疹及搔癢

Clopidogrel 保栓通錠



Bokey 伯基腸溶膠囊



Coumadin 可邁丁錠



Xarelto 拜瑞妥膜衣錠



Pradaxa 普栓達



護理指導

- ▶ 請讓所有照顧您的醫師及牙醫師知道您服用抗凝血劑。尤其是在**計畫進行手術、拔牙或侵入性檢查前**，必需主動告訴醫師。
- ▶ 避免從事容易引起挫傷、扭傷的危險性活動（例如：足球、橄欖球、拳擊等撞擊性運動）。若出現**嚴重關節腫脹或皮膚瘀青**，請立刻就醫。
- ▶ 避免割傷自己，請小心刷牙及刮鬍鬚，儘量使用**軟毛牙刷**及電動刮鬍刀。避免用力挖鼻孔，可能導致嚴重流鼻血。

護理指導

- ▶ 若不小心服用過量，或任何疑問，請立刻和醫師或藥師聯繫。
- ▶ **避免使用蔓越莓汁或其他蔓越莓製品**，因為會增加抗凝血作用導致嚴重出血。
- ▶ 發覺忘記服藥，請立即服用；但如果第二天才想到，只需服用當天醫師指示的藥量即可，**請不要服用兩天份的藥量**，因為容易造成出血。
- ▶ 若於服藥期間**懷孕**，請立刻告知醫師。

用藥安心諮詢專線

▶ 如用藥問題，可撥打陽明院
區藥劑科諮詢專線

2535-3456 轉

(日) 6123 (夜) 6175

