

文山園地 生態小百科

臺灣藍鵲

臺灣藍鵲，又稱臺灣暗藍鵲、紅嘴山鵲、長尾山娘或長尾陣仔，是臺灣特有種鳥類，也是保育類動物及台北市的市鳥。



分布

臺灣藍鵲主要分布在海拔 1,000 公尺以下的地區，而 1,800 公尺以下的中、低海拔闊葉林或次生林也可以看見牠的蹤跡。雖然如此，若山區環境開發過度或林相不夠豐富，往往也不會有臺灣藍鵲棲息。近年來，臺灣藍鵲已逐漸適應都市，如臺北市靠近山邊的地方就有臺灣藍鵲出沒，文山幼兒園和旁邊的木柵公園也出現過。

外觀



臺灣藍鵲成鳥身長 63 至 68 公分，體重約 254 至 260 公克。成鳥的嘴和腳是紅色，眼睛呈金黃色，頭至頸、胸部是黑色，翅膀末端為白色，身體其餘部分皆為藍色。尾羽部分，成鳥的兩根中央尾羽較長且末端為白色，其他尾羽則是中段黑末段白。

行為

1. 臺灣藍鵲多常成群行動，大多由家庭成員組成。
2. 牠們的飛行方式採直線飛行，排列有序。
3. 叫聲是聒噪的「嘎、嘎、嘎」聲，在群體中也會以「地笛——地笛——」或「嘎嘎——穗」等叫聲互相叫喚，叫聲變化多端。
4. 性情兇悍，領域性強，會攻擊入侵者，也會集體禦敵。
5. 臺灣藍鵲屬雜食性，食物包含植物的果實（如漿果、木瓜、香蕉）或根莖、其他鳥巢中的幼鳥或蛋、昆蟲、蜥蜴、蛇類、兩棲類和小型哺乳類（如鼠類）等，甚至也有人類的廚餘和動物屍體。牠們也會儲存及分享食物。

繁衍

1. 臺灣藍鵲的繁殖季在3月至9月，採成對繁殖。牠們會用叫聲搭配飛舞動作來求偶。在繁殖季，臺灣藍鵲不再成群結隊，變成兩兩一對。在稀疏的樹林築巢，樹種不拘，夠隱密即可。選好巢位後，雌、雄鳥會一同到地面銜小樹枝當巢的材料。牠們大約會花上一星期築巢，搭出來的巢像個淺碗。
2. 台灣藍鵲的子代存活率不高，幼鳥孵出22天後會離巢。離巢後的幼鳥會留在鳥群中與成鳥一同生活，且孵出的幼鳥會留在巢邊協助親鳥尋找巢材、餵食雛鳥或共同禦敵，屬於特殊的「合作育雛」行為。每年生兩窩，蛋殼呈淡青色且帶有褐斑，約需17天孵化。
3. 護巢心很強，會猛烈抵抗疑似入侵者，但以翅膀揮擊、驅離，幾乎不會傷害到民眾，動物保護單位呼籲民眾千萬不要傷害或捕捉他們，因為任何捕捉或飼養行為都是違法的。
4. 近年來，台灣藍鵲的棲地被外來種紅嘴藍鵲入侵，甚至還有臺灣藍鵲與紅嘴藍鵲同巢育雛的現象。



社會文化

臺灣藍鵲是臺灣原住民族鄒族的神鳥。在該族的神話中，很久以前鄒族因大洪水瀕臨滅族，幸好臺灣藍鵲犧牲自己生命帶回火種挽救了鄒族。

