

自費減量破傷風白喉非細胞性百日咳(Tdap)混合疫苗FAQ (1130321版)

序號	Q	A
1	與百日咳相關疫苗種類有哪些?	<p>1.白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗 (DTaP-Hib-IPV)：俗稱五合一疫苗，公費提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月接種共4劑。</p> <p>2.白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV)：公費提供兒童於滿5歲至入國小前接種1劑。</p> <p>3.減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap)：自費接種。</p>
2	孕婦減量破傷風白喉非細胞性百日咳疫苗(Tdap)接種建議?	依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，不論過去的破傷風、減量白喉混合疫苗 (Td) 或減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗 (Tdap) 接種史，每次懷孕應接種 1 劑 Tdap 疫苗，可在任何孕程接種。另為使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，建議於懷孕第28-36週接種；若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種。
3	為什麼建議孕婦接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳疫苗(Tdap)?	<p>1.嬰幼兒於出生滿2個月接種第1劑五合一疫苗之前，沒有百日咳的免疫力，極易受到傳染而罹患百日咳。</p> <p>2.因母親血中的IgG抗體可以藉由胎盤傳遞給嬰兒，孕婦若接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳疫苗，新生兒於出生時即可獲得來自母親的百日咳抗體保護而避免感染。</p>
4	接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳疫苗(Tdap)後副作用?	接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀，通常都是短暫的，會在數日內恢復，請勿揉、抓注射部位；如接種部位紅腫十分嚴重或經過數日不退、出現化膿或持續發燒，請儘速就醫。
5	減量破傷風白喉非細胞性百日咳疫苗(Tdap)接種地點	接種地點可參考臺北市衛生局官網/預防注射/自費疫苗相關資訊(網址： https://health.gov.taipei/News.aspx?n=2477B8F21D86D3BF&sms=9D2A009EA52F086A)