



臺北市立聯合醫院  
TAIPEI CITY HOSPITAL

## 血液透析暫時性雙腔導管 A temporary double-lumen catheter

### 一、什麼是暫時性雙腔導管：

適用於急性腎衰竭或慢性腎衰竭等待血管成熟的病人，需要長期或緊急血液透析治療時使用的血管通路，一般放置於鎖骨下靜脈、內頸靜脈或股靜脈

### 二、手術後應注意事項：

- (一) 每天更換敷料紗布
- (二) 污染、出血、潮濕時，需立即更換敷料
- (三) 導管放置後，如有出血、感染及血腫請馬上通知醫護人員

### 三、居家照顧應注意事項：

- (一) 導管必須避免扭結、牽扯或滑脫，與皮膚黏貼牢靠；當雙腔導管置放於股靜脈時，穿刺側肢體保持平直，應避免維持 90 度坐姿，以免扭曲導管
- (二) 導管插入處必須保持乾燥、避免用手抓癢，洗澡應採擦澡方式，避免泡澡
- (三) 如果導管插入處有滲液，應先徹底洗淨雙手，消毒傷口後再更換敷料。在醫院中應由醫護人員進行更換，勿自行處理
- (四) 任何尖銳物品，如：剪刀、安全別針不可靠近導管
- (五) 導管夾應置放適當處並關緊，勿自行調整開關，以免發生大量出血
- (六) 穿著寬鬆衣物，以避免更衣時造成導管之牽扯或移位
- (七) 睡姿勿壓迫到導管
- (八) 雙腔導管僅作透析用途，除非有特別醫囑，否則嚴格禁作其他用途，包括抽血
- (九) 每日應藉鏡子觀察導管是否有滑脫，若導管不小心滑脫，要立即以紗布或乾淨的布壓住導管穿刺處以防流血，並立即就醫處理
- (十) 每天檢查導管穿刺處有無紅腫、發紅、滲出液或壓痛，若有異常現象，宜儘速就醫

【續後頁】

(十一)導管若破裂，會有滲出液流出，應立即反折導管破裂處之上段，並以橡皮筋綑綁後，紗布包裹，立即就醫處理

(十二)如有呼吸困難、胸痛、咳嗽不止、發燒、發冷等情形可能有感染現象，應儘速就醫治療

#### 四、參考資料

丘周萍、張凱喬、桑穎穎 (2019)·泌尿系統疾病與護理·於王桂芸、劉雪娥、馮容芬總校訂，*新編內外科護理學下冊* (六版，122-127頁)·永大。

何永安、方昱偉、林佳勳、曾信凱、楊亞蓓、呂至剛、吳重寬(2021)·老年患者的血管通路·*腎臟與透析*，33(4)，168-172。

謝紅桂、陳玫君 (2019)·泌尿系統病人的護理·於蔡佩珊總校訂，*新編內外科護理技術下冊* (二版，26-30頁)·永大。

No.A0407

臺北市立聯合醫院護理部 111 年 06 月 30 日修訂