

用藥資訊仔細聽，動動手指就搞定

Step1. 選擇就診院區



Step2. 選擇用藥查詢功能




Step3. 點擊掃描功能，掃描藥袋上 QRcode 或手動輸入就診資料



Step4.

- (1) 選擇是否加入用藥提醒
- (2) 並可點擊藥品獲得詳細的藥物資訊
- (3) 或使用語音功能

1



2




3



藥袋字體放大




針對中重度視障朋友，本院提供藥袋字體放大功能，將放大後的內容(A4大小)，釘在藥袋上增加判讀程度



用法用量	[眼用藥]每天2次，早、晚，1 滴
藥名	艾弗目P無菌眼用溶液 5ML
外觀	
適應症	治療開放性隅角青光眼或高眼壓。
警語/副作用	1. 眼用。2. 避光保存25°C以下，開封後使用期限1個月。3. 可能有短暫視力模糊、眼睛搔癢等現象。4. **易致跌倒藥品。

藥袋點字貼紙

 臺北市立聯合醫院
Taipei City Hospital
網址: www.tpech.gov.tw 預約掛號: (02)2555-3000
本院客服中心: 1999轉888 外縣市請撥02-2555-3000

[中興] 一般處方(住院) 病床號:G72300 7A病房(外)

用量: 口服藥 口服, 每天3次, 三餐飯後, 每次1錠

用法: Oral 每日3次 After meals

臺北市政府衛生局 關心您

名稱: ★ Radi-K 595mg tab(Potassium gluconate) 發藥量: 4 錠
★ 鉀順錠(葡萄糖鉀) "寶齡富錦" [(10)] Quantity

外觀: 白色圓形錠 [PBF][104]
描述: White round tablet [PBF][104]
適應症: 血鉀過低症(因手術前後、使用藥物、瀉肚、心臟病引起之血鉀過低症)
適應症: potassium supplement


副作用: 1.可與食物併服。2.可能有腸胃不適、腹瀉、脹氣、皮膚搔癢、皮膚疹、高血鉀等現象。

用法: Take with meals. May cause stomach upset, diarrhea, flatulence etc.

未用完/過期藥品可直接拆除包裝並依一般垃圾進行資源回收分類

中午 Noon	晚上 Night	睡前 Bedtime	飯前 Before meals	隨餐 With meals	飯後 After meals

本院提供註記使用頻次之點字貼紙，使視障朋友更清楚如何用藥



每日3次



臺北市政府衛生局 關心您