



靜脈輸液注意事項 Intravenous infusion

一、目的：

- (一)由靜脈給藥
- (二)輸血或其它營養輸液
- (三)恢復和維持體液及電解質平衡

二、注意事項：

- (一)護理師依醫囑將靜脈注射點滴流速調好時，請不要自己調整速度，以免影響治療成效
- (二)勿用力拉扯點滴管路或固定處，防止針頭位移或滑脫
- (三)預防感染：保持針頭固定處清潔乾燥
- (四)維持點滴順暢：
 - 1.勿壓迫，扭曲點滴
 - 2.下床活動時，點滴瓶需高於注射部位約 75 公分
 - 3.注射部位放鬆放低，以免血液回流而阻塞
 - 4.注射於關節處，請盡量勿彎曲該關節，注射的肢體可以活動範圍，在不影響注射處針頭及牽扯或折到點滴管即可
- (五)發現以下問題，請告訴護理人員：
 - 1.注射部位紅、腫、熱、痛等現象
 - 2.針頭固定部位滲血或漏水
 - 3.點滴不滴、注射處疼痛
 - 4.點滴瓶將要滴空時
 - 5.針頭滑脫時
 - 6.呼吸困難，心跳加快等不適情形
- (六)點滴若不慎滴空時，即使有空氣在管子內，因壓力關係，空氣不會進入血管，請立即告知護理人員，不必驚慌

三、參考資料

- 卓燕華、葉麗玲、于凱齡、張鈞竹、陳雪玲（2015）。降低兒科病患靜脈注射後靜脈炎的發生率。《護理雜誌》，9，49-57。
- 郭素貞、王威蘋、周幸生（2015）。成人周邊靜脈注射新思維。《領導護理》，16（1），11-17。
- 王玉琴、邱珮華、李佳心（2021）。運用可掀式固定套降低學齡前兒童靜脈注射之害怕行為。《志為護理》，20（3），106-116。

No.H0208

臺北市立聯合醫院護理部 111 年 6 月 30 日修訂