

Acetaminophen 500mg

3

☞ 藥品商品名

Paramol(普除痛錠)

Depyretin(得百利寧錠)

☞ 藥物作用

Acetaminophen可緩解發燒以及輕至中度的疼痛。它可治療的疼痛包括頭痛，肌肉痛，骨關節炎，生理痛，感冒症狀，背痛與施打疫苗引起的注射部位疼痛。

☞ 服用方式

大人與 >12 歲兒童：每 4 至 6 小時可服用 1-2 顆 (一天最多 8 顆)。除非經醫師指示，勿連續使用超過 3 天。

7-12 歲兒童：每 4 至 6 小時可服用 1 顆 (一天最多 4 顆)。除非經醫師指示，勿連續使用超過 2 天。

< 7 歲兒童：不建議使用

藥品需與水或其他液體一起服用。勿超過建議劑量且服藥時間至少間隔 4 小時。當忘記服用一個劑量時，盡可能在您想起時立刻補服一個劑量。但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。

☞ 注意事項

1. 若對 acetaminophen 或其他仿單所標示的賦形劑過敏，則不可使用藥品。服用藥品前也需告知醫師或藥師是否有肝臟，腎臟方面的疾病，飲酒習慣或目前有嚴重的感染疾病。
2. 服用藥品期間應盡量避免飲酒，兩者併用會增加在肝臟的副作用。不應與其他含有 acetaminophen 成分的藥品同時使用因會造成劑量過高甚至中毒。
3. 請告知醫師或藥師目前是否有在使用其他藥物(包括非處方

藥，中藥以及保健食品)。

4. 如果您有以下症狀，請立即告知您的醫師或藥師，或直接前往附近的醫院急診就醫：呼吸急促，喘鳴或無法呼吸，臉部，唇，舌頭，喉嚨或其他身體部位腫脹，起疹，脫皮，蕁麻疹，皮膚癢，口腔潰瘍，異常出血或瘀血。
5. 孕婦用藥等級 A，沒有致畸形之慮，為安全藥物。但如果您已懷孕或計畫準備懷孕，就診時還是請務必告知醫師。
6. 哺乳期間可放心使用，為安全藥物。