

公費 HPV 疫苗疫苗接種常見問題

類別	問題	回答
一、疫苗 安全性	為何要施打 HPV 疫苗？	1. 為了預防子宮頸癌的發生。子宮頸抹片檢查功能在於『早期發現』子宮頸癌早期治療，而 HPV 疫苗功能在於『預防』子宮頸癌的發生。 2. 世界衛生組織(WHO)證實這是一支安全而穩定的疫苗，並建議 HPV 疫苗應納入國家疫苗接種計畫，目前全球也已有逾 100 個國家納入。
	HPV 疫苗施打前，一定要經過醫師評估？	是的，接種前必須先經醫師的評估診察，以確認接種者身體狀況，及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種。
	我是過敏體質，可以打 HPV 疫苗嗎？	若非對 HPV 疫苗成分過敏是可以接種，但接種 HPV 疫苗前，皆須先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於施打前主動告知醫師，由醫師評估是否施打疫苗。
	HPV 疫苗接種後發燒，是不是代表感染 HPV？	HPV 疫苗是不活化疫苗，接種後不會造成 HPV 感染。接種 48 小時後仍然持續發燒時，應立即就診，考慮是否另有其他感染或引起發燒的原因。
	HPV 疫苗接種，公費還是自費的保護效果好？	不論是公費或是自費 HPV 疫苗，均須符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，並取得許可證照，每批疫苗均經檢驗合格，其均可預防 HPV 感染引起的子宮頸癌。
	不同價數之 HPV 疫苗是否可以混合接種？	1. 目前尚無 HPV 疫苗價數混打之研究實證。 2. 不同價數之 HPV 疫苗不建議交互接種，應接種相同價數，請務必確認被接種者之接種史，再行安排接種服。

類別	問題	回答
		3. 接種兩劑疫苗之第 2 劑疫苗，主要是用以產生完整保護效果與長期免疫記憶力，從九價或四價疫苗改成二價疫苗時，將無法加強不包含在二價疫苗中病毒型別的免疫力。
	HPV 疫苗是否可以與其他	依據衛生福利部疾病管制署發布之「各項預防接種間隔時間一覽表」資料，HPV 疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。執行單位可因行政作業考量安排間隔。
二、疫苗接種副作用之預防	甚麼是暈針？	1. 暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年。大規模疫苗接種時，會有聚集性暈針現象，亦被認為集體心因性疾病，偶見於校園集中接種。 2. 暈針反應與疫苗本身安全性無關，不會造成身體健康的後遺症。
	如何預防暈針？	建議接種者於接種前不宜空腹，等待注射時間不宜過久，可使用音樂、影片或聊天等方式使其放鬆心情。接種時宜採取坐姿，並於接種後坐或躺約 30 分鐘，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。
	接種時「暈針」了，怎麼辦？	建議接種後先至休息區坐或躺下休息 30 分鐘，以緩解情緒緊張，同時通知醫護人員(在學校應通知醫護人員及學校老師)，如暈針現象持續，應儘快送醫院評估觀察。
三、接種地點及費用	若我屬於 HPV 疫苗接種計畫對象到本市公費 HPV 疫苗特約醫療院所施打 HPV 疫苗，需要額外付費嗎？	屬於 HPV 疫苗接種計畫對象之民眾，政府提供之 HPV 疫苗為免費的，惟民眾仍需依院所規定，自付掛號費及其他接種相關醫療費用；接種處置費由政府補助。

類別	問題	回答
	公費 HPV 疫苗接種，是否強制接種？	<p>1. 沒有強制接種。</p> <p>2. 學生接種 HPV 疫苗，需先經學生、家長閱讀過 HPV 疫苗相關訊息、HPV 疫苗接種通知說明及意願書，充分瞭解 HPV 疫苗相關資訊、並簽署同意，才安排疫苗接種，未經學生及家長同意者不會強制接種。</p>
四、接種不良事件	若學生接種公費 HPV 疫苗後身體不舒服改如何處理尋求幫助？	如接種後發生不良反應時，可撥打 24 小時諮詢專線 0800-883-513 或洽詢轄區健康服務中心尋求幫助。