

降血脂藥

7A病房關心您


簡介

▶ 作用：

降低血中膽固醇
及三酸甘油脂

▶ 副作用：


腹瀉、便秘、
腹痛、噁心、
嘔吐、肝功能
上升、痛風、
紅疹、頭痛、
噁心、疲倦、
偶有肌肉酸痛



Lipitor 立普妥



Lipanthyl 弗尼利脂寧膜衣錠



Crestor冠脂妥



Mevalotin 美百樂鎮錠



Livalo 立清之



護理指導

- ▶ 每日**按時服藥**，不要任意增加或減少藥量。
- ▶ 請依醫師指示**定期回診**。
- ▶ 服藥時，仍然需要**遵守飲食規範及規律的運動**。
- ▶ 請儘量**避免喝酒**，因為飲酒會增加體內三酸甘油脂。

護理指導

- ▶ 服藥期間，注意是否有出現**不正常的肌肉痠痛、頭痛、腹痛、便秘或腹瀉、肝功能異常**若出現此症狀，請馬上連絡您的醫師或是藥師。
- ▶ **葡萄柚(汁)** 會影響藥物的代謝，因此服藥期間，應**避免**經常性或大量飲用**葡萄柚(汁)**。

用藥安心諮詢專線

- ▶ 如用藥問題，可撥打陽明院
區藥劑科諮詢專線
2535-3456轉(日)6123(夜)6175

